国家林业局植物新品种保护办公室初审公告

(第 1501 号)

按照《中华人民共和国植物新品种保护条例》和《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(林业部分)》的有关规定,现将国家林业局受理并经初步审查合格的植物新品种权申请公开,请申请人按照有关规定于三个月内缴纳审查费。任何人均可对其中不符合条件或不实之处,向国家林业局植物新品种保护办公室提出书面异议请求,并说明理由。

特此公告。

2015 年 2 月 10 日

壮榉

所属的种或属:榉属

培育人:黄利斌 张敏 董筱昀 窦全琴 吕运舟

申请人:江苏省林业科学研究院

申请号:20140138

申请日:2014 年 8 月 29 日

说明:(1)品种的基本特征:落叶高大乔木,树冠形态近柱形,主干通直明显,分枝斜上,分枝角 30—45 度;树皮呈青灰色;叶片厚纸质,较粗糙,两面密被柔毛,生长季叶色深绿色,秋叶红色。

(2)品种特异性:主干通直明显,分枝角斜上生长,树冠呈伞形;生长季叶色绿色,秋叶红色。

申请品种‘壮榉’与普通大叶榉树的特异性状对比

性状	壮榉	普通大叶榉树
植株:树冠	近伞形	杯形
植株:主干	主干明显	分枝较低,主干易分叉
树皮:颜色	青灰色	棕色或棕褐色
分枝:分枝形态	斜上,分枝角 30—45 度	斜展,分枝角度一般 45—60 度,形态不一
叶片:秋季叶色	红色	棕红色或黄绿色

申请品种尚未公开销售。

冲天

所属的种或属：榉属

培育人：黄利斌 董筱昀 窦全琴 张敏 吕运舟

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140139

申请日：2014年8月29日

说明：(1) 品种的基本特征：落叶高大乔木，树冠形态近柱形，主干通直明显，分枝斜上紧抱，分枝角30度左右；树皮呈灰色；叶片厚纸质，较粗糙，两面密被柔毛，生长季叶色深绿色，秋叶红褐色。

(2) 品种特异性：主干通直明显，分枝斜上紧抱，树冠近柱形；生长季叶色深绿色。

申请品种‘冲天’与普通大叶榉树的特异性状对比

性状	冲天	普通大叶榉树
植株：树冠	近柱形	杯形
植株：主干	主干明显	分枝较低，主干易分叉
植株：分枝形	斜上，紧抱	斜展，分枝角度一般45—60度，形态不一
叶片：生长季叶色	深绿色	绿色

申请品种尚未公开销售。

飞龙

所属的种或属：榉属

培育人：黄利斌 董筱昀 窦全琴 张敏 吕运舟

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140140

申请日：2014年8月29日

说明：(1) 品种的基本特征：本品种属于大叶榉树，落叶乔木，树冠呈圆头形，主干不明显，主分枝基部斜上，分枝角度大于60度，上部弧状树弯曲下垂，小枝弧状弯曲下垂，枝条呈灰褐色。叶片厚纸质，较粗糙，两面密被柔毛。

(2) 品种特异性：树冠呈圆头形，主干不明显，分枝基部斜上，上部弯曲下垂，小枝细柔下垂。

申请品种‘飞龙’与普通大叶榉树的特异性状对比

性状	飞龙	普通大叶榉树
植株：树冠	圆头形	杯形
分枝：枝形	基部斜上，上部弧状弯曲下垂，小枝细柔，弧状弯曲下垂	斜展，分枝形态不一
分枝：角度	分枝角大于 60 度	分枝角一般在 45—60 度

申请品种尚未公开销售。

拂水杉

所属的种或属：落羽杉属

培育人：黄利斌 窦全琴 董筱昀 张敏 蒋泽平

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140141

申请日：2014 年 8 月 29 日

说明：(1) 品种的基本特征：落叶乔木树形呈塔形，有直立主干，但稍弯曲，分枝角大于 90 度，分枝形态或向下或近平展；小枝细柔下垂；脱落性小枝和小枝上叶片较稀疏；叶线形，新叶淡绿色，生长季叶色绿色，秋季叶色棕红色；秋叶变色期约 1 个月(11 月下旬至 12 月下旬)。

(2) 品种特异性：枝形为下垂形，一级分枝角一般在 90—135 度之间，小枝细柔下垂。

‘拂水杉’与国外对照品种‘小瀑布’特异性状对比

性状	拂水杉	小瀑布
植株：树冠	塔形，有明显主干	伞形，无明显主干
分枝：枝形	下垂，角度 90—135 度	下垂，角度大于 135 度

申请品种尚未公开销售。

绿柱

所属的种或属：柳杉属

培育人：黄利斌 窦全琴 张敏 董筱昀 蒋泽平 李晓储

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140142

申请日：2014 年 8 月 29 日

说明：(1) 品种的基本特征：常绿高大乔木，主干通直明显，冠幅小，树冠近圆柱形；树皮棕褐色，裂成条片状脱落；侧枝轮生，斜上紧抱，分枝角度小，小枝密生当年生枝条绿色；叶钻形，直促，先端不内曲，大树上部生长季嫩芽有时呈淡黄色，冬季叶色绿色，不变成红褐色；不结实或结实量很少。

(2) 品种特异性：树冠近圆柱形，主干通直明显，侧枝斜上，密生，紧抱，冬季叶

色绿色，不开花结实或结实很少。

‘绿柱’与国内同类品种‘圆头柳杉’特异性状对比

性状	绿柱	圆头柳杉
植株：树冠	近圆柱形	圆头形
植株：主干	乔木，主干通直	乔木，主干上部分成多干，直伸或斜展
分枝：形态	侧枝斜上生长，密生，紧抱	侧枝多，密生

申请品种尚未公开销售。

秋艳 1 号

所属的种或属：乌柏属

培育人：黄利斌 陈庆生 窦全琴 董筱昀 张敏 倪竞德 蒋泽平

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140143

申请日：2014 年 8 月 29 日

说 明：申请品种的基本特性：落叶乔木，树冠卵圆形，树皮浅紫红色，二叉分枝，分枝多，缺乏明显主干。叶近菱形，先端尖。秋季叶片颜色先由绿色逐渐转变紫红色，后变为鲜红色，秋叶变色时间较早（10 月 25 日左右），平均变色期长 30d 左右（约至 11 月 25 日）。开花特性属葡萄柏品种类型。

（1）品种特异性：秋季叶片变色早，颜色先由绿色转变成紫红色，再变成亮红色，鲜艳美丽，变色期平均为 30d 左右（约 10 月 25 日至 11 月 25 日）。

‘秋艳 1 号’与对照普通乌柏的特异性状对比

性状	秋艳 1 号	普通乌柏
叶片：秋季叶色	由绿色转变为紫红色，再变成亮红色，变色较早，叶色鲜艳，变化一致	叶色变化不一致或不鲜艳

申请品种尚未公开销售。

紫艳

所属的种或属：乌柏属

培育人：董筱昀 黄利斌 窦全琴 张敏 梁珍海 吕运舟

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140144

申请日：2014年8月29日

说明：申请品种基本特性：落叶乔木，树冠卵圆形，树皮浅紫红色，二叉分枝，分枝多，缺乏明显主干。叶近菱形，先端尖。秋季叶片从11月上旬开始变色，颜色先由绿色逐渐转变为紫色，再由紫色转变成深紫红色，平均变色期长25d左右（约至11月25日）。开花特性属葡萄柏品种类型。

(1) 品种特异性：秋季叶片颜色先由绿色转变成紫色，再变成深紫红色，变色期平均为25d左右。

‘紫艳’与对照普通乌柏的特异性状对比

性状	紫艳	普通乌柏
叶片：秋季叶色	由绿色转变为紫色，再变成深紫红色，叶色鲜艳，变化一致	叶色变化不一致或不鲜艳

申请品种尚未公开销售。

秋皇1号

所属的种或属：乌柏属

培育人：黄利斌 董筱昀 张敏 窦全琴 梁珍海 蒋泽平

申请人：江苏省林业科学研究院

申请号：20140145

申请日：2014年8月29日

说明：(1) 品种的基本特性：落叶乔木，树冠卵圆形，树皮灰黄色，二叉分枝，分枝多，缺乏明显主干。叶近菱形，叶长7.7cm，宽5.5cm，叶柄长5.5cm，先端尖。秋叶11月上旬开始变色，叶片颜色先由绿色逐渐转变为亮黄色，平均变色期长25d左右。开花特性属葡萄柏品种类型。

(2) 品种特异性：秋季叶片变色早，颜色先由绿色转变成亮黄色，鲜艳美丽，变色期平均为25d左右（约11月5日至11月25日）。

‘秋皇1号’与对照普通乌柏的特异性状对比

性状	秋皇1号	普通乌柏
叶片：秋季叶色	由绿色转变为亮黄色，叶色鲜艳，变化一致	叶色变化不一致或不鲜艳

申请品种尚未公开销售。

锦昱楝

所属的种或属：楝属

培育人：包建英 吴国平 卢明先 范军科

申请人：范军科

申请号：20140146

申请日：2014年8月31日

说明：落叶乔木，树冠伞形，树皮浅纵裂灰色幼时平滑。枝上皮孔明显。当年生枝青色，密生白色皮孔，叶痕隆起，2--3回奇数羽状复叶，生长季嫩的小叶呈淡黄色或淡黄色叶面具不规则的大小不等的绿岛；成熟小叶呈白色或白色叶面具不规则的大小不等的绿岛，小叶卵形或卵状皮针形，长3--7厘米，基部楔形或圆形，叶缘具锯齿或裂。圆锥状复聚伞花序与叶等长，腋生，花蓝紫色，萼片与花瓣各5片，有芳香味，5月开花。核果球形黄色，直径1--1.5厘米。10--11月成熟。如下表说明锦昱楝的特异性：

品种名称 \ 性状对比	嫩叶色	成熟叶色
锦昱楝	小叶呈淡黄色或淡黄色叶面具不规则的大小不等的绿岛	小叶呈白色或白色叶面具不规则的大小不等的绿岛
苦楝	绿色	绿色

申请品种尚未公开销售。

锦叶黄杨

所属的种或属：卫矛属

培育人：范军科

申请人：范军科

申请号：20140147

申请日：2014年8月31日

说明：常绿灌木或小乔木，高可达8米，一年生枝绿色、略为四棱形。叶革质且具光泽，椭圆形至倒卵形，长4厘米左右，缘有钝齿，两面无毛；自2月中旬萌芽至整个生长季的嫩叶亮金黄色，近熟叶黄绿色，质厚；叶柄长0.6--1.2厘米。花绿白色，多生于枝稍叶腋，5--12朵成聚伞花序，蒴果扁球形，径约0.8厘米，粉红色，熟时4瓣裂；假种皮橘红色。5月开花，10月果熟。

申请品种与近似品种比较的主要不同点如下：

品名 \ 性状	锦叶黄杨	大叶黄杨
嫩叶色	亮金黄	绿
近熟叶色	黄绿	绿

申请品种尚未公开销售。

浴火凤凰

所属的种或属：蔷薇属

培育人：邱显钦 王其刚 唐开学 李淑斌 陈敏 蹇洪英 张颢 周宁宁

申请人：云南省农业科学院花卉研究所

申请号：20140148

申请日：2014年9月1日

说明：申请品种‘浴火凤凰’为直立宽灌木，多头庭院月季，单枝花苞数5-16个，植株高度50-80cm；花黄混色，花径7-8cm，花瓣数8-12枚，半重瓣中花型，花瓣倒卵圆形，边缘微反卷；萼片边缘延伸程度中等，花梗长度中等，有刺毛；叶片5-7小叶，大小中等，叶脉清晰、深绿色、叶表面光泽度强；顶端小叶卵圆形，叶尖渐尖，基部钝形，叶缘单锯齿，嫩枝红棕色，嫩叶红褐色，茎杆浅绿色；植株茎杆上端皮刺少，下端为弯刺中等，刺大无小密刺；植株生长势强，抗病性强，可用作庭院或者盆栽种植。

特异性说明：

申请品种‘浴火凤凰’与近似品种‘彩虹’比较，在花型、花色、花瓣形状、花瓣数量、花梗形态等方面具有明显差异，详见下表：

性状	申请品种：‘浴火凤凰’	近似品种：‘彩虹’
花型	阔瓣中花型	卷边小花型
花瓣数量	8~12	45~50
花瓣形状	倒卵圆形	心型
花瓣颜色	里面边缘 RHS 52B	里面边缘 RHS 11D
	里面中央 RHS 9A	里面中央 RHS 12A
	外面边缘 RHS 11D	外面边缘 RHS 11D
	外面中央 RHS 12B	外面中央 RHS 11A
花梗：茸毛或刺毛	刺毛	茸毛
茎杆皮刺形态	上端：无；下端：弯刺	上端：弯刺；下端：弯刺

申请品种尚未公开销售。

公主梦

所属的种或属：蔷薇属

培育人：周宁宁 王其刚 唐开学 蹇洪英 陈敏 晏慧君 邱显钦 张婷 张颢

申请人：云南省农业科学院花卉研究所

申请号：20140149

申请日：2014年9月1日

说明：申请品种‘公主梦’为矮灌木，植株高度30cm-40cm；花粉白色，多生于茎顶，半开放时花苞呈杯状，完全开放时，呈菜包状。花瓣正面边缘颜色为RHS N155B，正面中央颜色RHS 63C，背面颜色为RHS N155B。花瓣数50-65枚，花瓣阔瓣形，完全开放时花径6-7cm，

萼片延伸程度中；花梗短，红棕色；3-5小叶，小叶卵圆形，叶脉清晰、深绿色、光泽度强，叶缘复锯齿、顶端小叶基部圆形，小叶叶尖渐尖形；花枝红棕色；植株皮刺为弯刺，刺较少，红棕色；植株生长旺盛，抗病性中。

特异性说明：申请品种‘公主梦’与近似品种‘香淡粉’比较，在花苞大小、花瓣数量、复叶、花梗、枝刺等方面具有明显差异，详见下表：

性状	申请品种：‘公主梦’	近似品种：‘香淡粉’
完全开放时花苞大小（cm）	6-7	8.5-9.5
花瓣数量	50-65	20-28
花梗和花枝颜色	红棕色	绿色
复叶大小（cm）	5-6	9-10
复叶小叶数	3-5	5-7
刺数量	少	中等
刺形态	弯刺、红棕色	斜直刺、黄褐色

申请品种尚未公开销售。

云香

所属的种或属：蔷薇属

培育人：周宁宁 王其刚 邱显钦 李淑斌 王丽花 吴旻 张婷 晏慧君 蹇洪英 唐开学 张颢

申请人：云南省农业科学院花卉研究所

申请号：20140150

申请日：2014年9月1日

说明：申请品种‘云香’为宽灌木，植株直立，植株高度 70cm-90cm；花玫红色，花浓香，单生于茎顶，阔瓣大花型，花俯视形状为不规则圆形，花瓣正面颜色均匀，背面基本有白色，花瓣数 45-55 枚，花瓣阔瓣形，外轮花瓣边缘具缺裂，花径 10-12 cm，萼片延伸程度弱；花梗长，少量刺毛；5-7小叶，小叶卵圆形，叶脉清晰、深绿色、光泽度强，叶缘复锯齿、顶端小叶基部圆形，小叶叶尖渐尖形，嫩叶红褐色；花枝绿色；植株皮刺为斜直刺，细长，中下部较多，少量皮刺为黄绿色；植株生长旺盛，抗病性强。

特异性说明：

申请品种‘云香’与近似品种‘唐娜小姐’比较，在花瓣、叶片、刺等方面具有明显差异，详见下表：

性状	申请品种：‘云香’	近似品种：‘唐娜小姐’
花瓣正面边缘颜色	RHS N57A	RHS N57C
花瓣正面中央颜色	RHS N57B	RHS N57C

花瓣背面边缘颜色	RHS N66C	RHS N57D
花瓣背面中央颜色	RHS N66B	RHS N57D
叶：叶表面光泽	强	弱
小叶基部	圆形	楔形
长刺(大刺)：数量	多	中等
刺形态	细长、黄绿色	下部较宽、黄褐色

申请品种尚未公开销售。

红屹海棠

所属的种或属：苹果属

培育人：沈向 吴桂昌 毛志泉 谢作 胡艳丽 王西武 陈学森 黄育彬 张文会 刘西岭

申请人：山东农业大学 棕榈园林股份有限公司

申请号：20140151

申请日：2014年9月3日

说明：特异性：四年生植株高3.6m，冠径0.5m，树姿柱形，多年生枝干灰褐色，小枝为红棕色，叶片阔椭圆形，嫩叶为紫红色，成熟叶片暗绿色，质地革质，长10.2cm左右，叶长宽比在1.5-1.7之间，先端渐尖，基部近圆形，主叶脉明显，表面无毛，叶缘锯齿钝，叶面有褶皱，叶姿直立；叶柄长2.9-3.4cm，被柔毛。花期中晚，花粉色，每个花序有4-6朵花，花朵直径4.4-5.4cm，与花梗大约成90°；花瓣长卵圆形，基部有爪，先端钝，平展，邻接；雄蕊长0.7-1.1cm，花丝粉色，花药暗红色；花柱长1.1-1.3cm，粉色，有少量白色绒毛；花梗细长，长2.9-3.2cm，酒红色，无毛；萼片三角形，先端渐尖，长0.65-0.75cm，边缘具稀疏腺齿，外面被柔毛；果实较大，直径1.5-2.0cm，两端均凹陷，果实为暗红色；果熟期7-9月。与对照品种红丽相比较，树姿柱形，简单紧凑，易整形；花期早，花直径大，花色嫩而不艳；果实果个大，暗红色，果面有白色果粉，侧枝极短，像一束花束。观花的同时，也是观果的优良品种。与母本主要差异见下表：

品种	红屹海棠	红丽海棠
树姿	树姿柱形	树姿较开张，宽卵圆形
花期	稍晚	适中
花色	粉色	洋红色
果个	较大	中大
果色	暗红	紫红色，有白粉
叶色	嫩叶为紫红棕色，成熟叶片暗绿色	新叶酒红色，成熟叶片橄榄绿

申请品种尚未公开销售。

红雾海棠

所属的种或属：苹果属

培育人：沈向 冯冰 毛志泉 赵强民 胡艳丽 李兰珍 陈学森 刘焱 李欣 邹绵山

申请人：棕榈园林股份有限公司 山东农业大学

申请号：20140152

申请日：2014年9月3日

说明：特异性：小乔木，树姿开张，树冠椭圆形，四年生植株高 2.8m，冠径 1.8m，枝干棕褐色，小枝颜色为红褐色，叶片阔卵圆形，叶尖渐尖，叶基半圆形，叶缘钝，有的叶片叶缘有裂刻，叶片幼嫩时呈紫红色，被白色短绒毛，成熟后绿色，质地革质，长 6.2-7.3cm，叶长宽比在 2.0 左右，表面被稀疏白色柔毛，叶姿直立；叶柄长 2.7-2.9cm，淡红色，被细密白色柔毛。花期晚，花嫩粉色，每个花序有 3-5 朵花，花朵直径 3.5-4.0cm，与花梗大约成 90°；花瓣长圆形，基部有短爪，先端钝，平展，重叠；雄蕊长 0.7-0.8cm，花丝粉红色，花药暗红色；花柱长 0.7-0.8cm，有少量白色绒毛；花梗细长，长 2.9-3.4cm，酒红色，无毛；萼裂片披针形，先端渐尖，长 0.50-0.56cm，边缘具稀疏腺齿，外面被稀疏柔毛；果实较小，直径 1.0-1.5cm，果色暗红色，果点明显，果萼极长，外凸，果实宿存；果熟期 9-10 月。与对照品种红丽相比较，树姿开张，树形圆整；花期较晚，花直径小，花色娇嫩；果实暗红色，果面光滑，娇小可爱；叶片幼嫩时紫红色，表明有浓密白色绒毛，远观整棵树犹如笼罩在云雾中，故命名为红雾海棠，是观花、观果、观叶的优良观赏品种。此外，花粉产量高，亲和性好，做观赏海棠的同时，适宜做苹果授粉树，是一种多用途观赏海棠品种。与母本主要差异见下表：

品种	红雾海棠	红丽海棠
树姿	树姿开张，树冠椭圆形	树姿较开张，宽卵圆形
花期	晚	适中
花色	嫩粉色	洋红色
果个	较小，果萼长且宿存	中大
果色	暗红色	紫红色，有白粉
叶色	幼嫩时呈紫红色，被白色短绒毛，成熟后绿色	新叶酒红色，成熟叶片橄榄绿

申请品种尚未公开销售。

红菱海棠

所属的种或属：苹果属

培育人：沈向 刘坤良 毛志泉 许华林 胡艳丽 曹照忠 陈学森 刘玉玲 孙凡雅 刘桥

申请人：山东农业大学 棕榈园林股份有限公司

申请号：20140153

申请日：2014 年 9 月 3 日

说明：特异性：四年生植株高 4.5m，冠径 3.0m，树姿开张，呈宽圆锥形，树势强壮。多年生枝干棕褐色，小枝紫红色。叶片阔椭圆形，幼叶颜色为橙红色，成熟时变为绿色，质地革质，长 7.6-9.0cm 左右，叶长宽比在 1.5-1.9 之间，先端渐尖，基部圆形，主叶脉明显，表面有毛，主叶脉处明显，叶缘锯齿尖，叶面平展，叶姿直立；叶柄长 2.6-3.5cm，被白色柔毛。花期较晚，花玫红色，每个花序有 4-5 朵花，花朵直径 3.9-4.5cm，花朵不平展；花瓣卵圆形，基部有爪，先端圆，边缘均有较深的褶皱，重叠；雄蕊长 0.75-0.8cm，花丝粉色，花药黄色；花柱长 1.0-1.1cm，有少量白色绒毛；花梗细长，长 3.7-4.6cm，黄绿色，无毛；萼片三角形，暗红色，先端渐尖，长 0.6-0.7cm，边缘具稀疏腺齿，外面被柔毛；果实中等大小，直径 0.8-1.0cm，两端均凹陷，脱萼，果实上色均匀后紫红色；果熟期 7-9 月。与对照品种红丽相比较，树姿开张，树势强壮；花期稍晚，花直径略小，花色美艳靓丽，边缘翘起，如一个个小小的菱角，故名红菱海棠，到落花期，花色呈粉红色，亦没有颓败之感；果实果个较小，紫红色，果色典雅。观

花的同时，也是观果的优良品种。花粉活力高，授粉效果好，可作为苹果授粉树。与母本主要差异见下表：

品种	红菱海棠	红丽海棠
树姿	树姿开张，呈宽圆锥形	树姿较开张，宽卵圆形
花期	稍晚	适中
花色	玫红色，落花期转为粉红色	洋红色
果个	较小	中大
果色	紫红色	紫红色，有白粉
叶色	幼叶为橙红色，成熟叶为绿色	新叶酒红色，成熟叶片橄榄绿

申请品种尚未公开销售。

红羽大果油茶 1 号

所属的种或属：山茶属

培育人：羽雄安 陈国臣 马锦林 张乃燕 王东雪 陈林强 叶航 江泽鹏

申请人：广西壮族自治区林业科学研究院

申请号：20140154

申请日：2014 年 9 月 10 日

说明：常绿高大乔木，树形直立，树皮灰色。叶色呈深绿，春梢 2~5 月底，夏梢 6 月初~9 月初。叶片呈矩圆形或长椭圆形，长 9~20 厘米，宽 4~9 厘米，先端渐尖，基部楔形，叶缘上部 1/3 以上有锯齿，中脉粗壮，侧脉 6~9 对，背面突起，叶柄长 1~1.5 厘米，无毛，上面具槽。花期 11 月底至次年 2 月底或 3 月初，花红色，单生或两朵着生于枝顶，直径 6~7 厘米，无柄，盆状或杯状展开；萼片 11 枚，木质化；花瓣 6~8 枚，肉质，呈阔倒卵形，长 4~5 厘米；雄蕊多数，3~4 轮，长 3~4 厘米，外轮花丝下半部合生，花柱长 2.5~3.5 厘米，3~5 浅裂。蒴果球形或近球形，底部有明显的脐状，直径 6~12 厘米，3~5 室，果皮厚 1.5~2.2 厘米，每果有种子 10~30 粒。

与当地广宁红花油茶相比，不同点如下：

品种	叶形	果实形状	果皮厚度（厘米）
红羽大果油茶 1 号	矩圆形或长椭圆形，先端渐尖，基部楔形	球形或近球形，底部有明显的脐状	1.5-2.2
广宁红花油茶	椭圆形，先端急尖，基部近圆形	球形、近球形或扁球形，底部无明显的脐状	2.0-2.7

申请品种尚未公开销售。

红羽大果油茶 2 号

所属的种或属：山茶属

培育人：陈国臣 羽雄安 马锦林 张乃燕 王东雪 陈林强 叶航 江泽鹏

申请人：广西壮族自治区林业科学研究院

申请号：20140155

申请日：2014 年 9 月 10 日

说明：常绿乔木，树形直立，枝叶浓密，树皮呈灰色。叶片呈长圆状椭圆形，先端渐尖，基部近圆形，叶缘微波，叶片多呈扭曲状；叶柄长 1-1.5 厘米，叶长 10-20 厘米，宽 4-8 厘米，叶片 1/2 以上有

锯齿。12月中旬始花，花期3个月；花量大，花红色，花冠比广宁红花油茶较小，直径3-4厘米，无柄，盆状或杯状展开。蒴果近球形，底部有明显的脐状，每果重150-400克，多为4室，皮厚0.9-1.5厘米，种子12-25粒，鲜出籽率达25-28%。

与对照广宁红花油茶比较不同点如下：

品种	叶形	花径	果形	单果重	果皮厚
红羽大果油茶2号	长圆状椭圆形；先端渐尖；叶缘微波，叶片呈扭曲状	3-4cm	球形或近球形，底部有明显的脐状	150-400g	0.9-1.5cm
广宁红花油茶	椭圆形；先端急尖；叶片平展	6-10cm	球形、近球形或扁球形，底部无明显的脐状	350-700g	2.0-2.7cm

申请品种尚未公开销售。

巨龙

所属的种或属：青檀属

培育人：张林 孙忠奎 李承秀 程甜甜 陈荣伟 王长宪 张安琪 王峰 牛田 颜婷美

申请人：泰安市泰山林业科学研究院 泰安时代园林科技开发有限公司

申请号：20140156

申请日：2014年9月11日

说明：(1)品种的基本形态特征

落叶乔木，干皮浅灰色，皮孔凸起有星点，单叶互生、厚纸质、近圆形，叶片长9.5-16.0cm、宽8.0-14.0cm，边缘有锐锯齿，叶面特别粗糙，叶基稀心形，稍歪斜，具明显三出脉，侧脉在边缘处弧曲向前，叶面有短硬毛，脉腋常有簇生毛；叶柄长1.1-1.5cm，有毛，基部具针状托叶两枚，有毛；成熟叶片颜色深绿色(N137D)。花期4月；果8-9月成熟。

(2)品种特异性 ‘巨龙’与对照普通青檀比较性状差异如下：

品种性状	巨龙	普通青檀（母树）
株型	高	中
叶片大小	较大	中
叶片表面	特别粗糙、深绿色	粗糙、浅绿色

申请品种尚未公开销售。

青龙

所属的种或属：青檀属

培育人：张林 王峰 王郑昊 李承秀 王波 王长宪 孙忠奎 张安琪 杜辉 王富金

申请人：泰安市泰山林业科学研究院 泰安时代园林科技开发有限公司

申请号：20140157

申请日：2014年9月11日

说明：(1)品种的基本形态特征

落叶乔木；干皮灰褐色，皮孔线形较小有星点，植株较矮；单叶互生、纸质、多椭圆状卵形，叶片长1.5-10.5cm,宽1.0-6.5cm,边缘有锐锯齿，先端长尾状渐尖，叶面粗糙，叶基宽楔形，稍歪斜，具明显三出脉，侧脉在边缘处弧曲向前，上面有短硬毛；叶柄长0.3-1.2cm,有毛；成熟叶片颜色绿色(N137A)；花期4月；果8-9月成熟。

(2)品种特异性 ‘青龙’与对照普通青檀比较性状差异如下：

品种	青龙	普通青檀（母树）
性状		
株型	矮	高
叶片大小	较小	中

申请品种尚未公开销售。

凤目

所属的种或属：青檀属

培育人：张林 张安琪 颜卫东 宋新红 李承秀 王长宪 王峰 孙忠奎 于永畅 王郑昊

申请人：泰安市泰山林业科学研究院 泰安时代园林科技开发有限公司

申请号：20140158

申请日：2014年9月11日

说明：(1)品种的基本形态特征

落叶乔木；干皮灰褐色，皮孔白色较小,有星点，植株较矮，单叶互生、纸质、椭圆状卵形，叶片长1.5-9.5cm,宽0.8-4.5cm，边缘有锐锯齿，先端长尾状渐尖，叶面粗糙，叶基宽楔形或近圆形，稍歪斜，具三出脉，侧脉在边缘处弧曲向前，上面无毛或少量有毛；叶柄长0.2-0.8cm，有毛，基部具针状托叶两枚；成熟叶片颜色绿色(N137B)。花期4月；果8-9月成熟。

(2)品种特异性 ‘凤目’与普通青檀比较性状差异如下：

品种	凤目	普通青檀（母树）
性状		
株型	矮	高
叶片大小	极小	中
叶片性形状	叶片长卵形、叶尖弯曲	叶片卵圆形

申请品种尚未公开销售。

雪野花椒

所属的种或属：花椒属

培育人：王晓英 王新花 黄艳艳 赵涛 吴其峰

申请人：泰安市泰山林业科学研究院

申请号：20140159

申请日：2014年9月11日

说明：基本形体特征：落叶小乔木，实生繁育苗生长势强，枝条短而粗，分枝角度大。1年生枝褐绿色，多年生枝灰褐色。1~2年生的实生幼树有皮刺；3年生以上树，当年生新梢仍有皮刺，随着新梢级次的增加，皮刺逐渐退化脱落。5年生“雪野花椒”的果穗无刺，其茎干枝上的刺稀疏；比大红袍刺减少90%以上。奇数羽状复叶，小叶5-11，叶片长椭圆形，先端渐尖，叶缘有细锯齿。聚伞状圆锥花序，花单性，花被片4~8枚，雄花具有5~7枚雄蕊，雌花的心皮3~4枚，无子房柄。蓇葖果成熟时呈红色转深红色，圆球形，多2~3个集生，密生疣状腺点，种子圆卵形，黑色。果粒大、肉厚、密生突起半透明的芳香油腺体，油重丹红、芳香浓郁、具有醇麻适口的风味，品质优。果实8月下旬成熟，比大红袍晚5-7天，平均每个果穗有花椒68粒左右，比大红袍高21%，单株果穗数比大红袍高8%，丰产性好。

品种特异性：‘雪野花椒’与‘大红袍花椒’性状差异如下：

品种	果穗粒数	果穗果枝	果穗	果柄	生长速度	果实成熟期
雪野花椒	含单果数50-90粒	无刺	密集	短	快	8月下旬
大红袍花椒	含单果数比雪野花椒低21%	有刺	松散	长	较慢	比雪野花椒早5-7天

申请品种尚未公开销售。

金红杨

所属的种或属：杨属

培育人：程相军 宋宏伟 杨淑红 张江涛 郭义民 程相魁

申请人：商丘市中兴苗木种植有限公司

申请号：20140160

申请日：2014年9月23日

说明：生物学特性：金红杨叶片较小，呈三角形，主干通直，高大乔木，叶片从春天发芽开始为鲜红色，夏季依次为桔红色，金黄色，黄绿色，秋季落叶前为桔黄色，叶片颜色与对照比较的不同特点如下：

品种	叶片特征			
	面积 (cm ²)	春季颜色	夏季颜色	秋季颜色
金红杨	116.78	鲜红色	桔红色、金黄色、黄绿色	桔黄色
全红杨	99.87	深紫红色	紫红色	鲜红色
中红杨	194.54	玫瑰红色	褐绿色	桔黄色

申请品种尚未公开销售。

铺地红霞

所属的种或属：蔷薇属

培育人：潘会堂 赵红霞 张启翔 罗乐 丁晓六 王晶 刘佳 于超 程堂仁 王佳

申请人：北京林业大学 国家花卉工程技术研究中心

申请号：20140161

申请日：2014年9月24日

说明：形态特征：匍匐灌木，株高 30-45cm，冠幅 70-80cm。茎干皮刺少，具平直刺，嫩枝上有紫红色小毛刺，老枝绿色，仅嫩枝紫红色。羽状复叶，小叶 5-7，长椭圆形，叶缘紫色，具单锯齿，两面近无毛，上表面绿色，无光泽，背面浅绿色，叶长 2-4cm，宽 1-3cm，叶柄紫红色，背面具倒钩刺；多朵花聚生于枝顶，属伞形花序，具总苞，每朵花具小苞片；花玫红色（Red N57C-Red N66C），花瓣 20-30 枚，初开时花型高心翘角杯状，开放后呈盘状，直径 5-6cm，开放末期会出现褪色，花量大，耐开，成束开放。萼片卵状披针形，5 片均无延伸，缘有短白色柔毛和腺毛，内面具白色绒毛，外有腺点。花期 5 月初，一直持续到 11 月。

品种	花型	瓣性	花色	抗病力
‘铺地红霞’	初开时高心翘角，开放后呈盘状	20-30 枚	玫红色	强
‘红帽子’	盘状	14-20 枚	深红色	强

申请品种尚未公开销售。

玉龙绯粉

所属的种或属：梅

培育人：张启翔 孙丽丹 王佳 潘卫华 邓黔云 张玲

申请人：北京林业大学 丽江得一食品有限责任公司 国家花卉工程技术研究中心

申请号：20140162

申请日：2014年9月24日

说明：玉龙绯粉为云南丽江中海拔地区（2300 m）实生选育花果兼用梅新品种。树冠开张直立，主干表面颜色为灰褐色，枝刺少，新生木质部是绿白色，花芽 1-2 朵着生，相对花期晚，花繁密，花梗短，花萼绛紫色，萼片为 5-6 个，花蕾红色，顶端有复色，花瓣为 15-20 个，重瓣浅碗型，红色，有色晕，雄蕊与花瓣约等长，雌蕊 1-3 个，柱头外露，绿白色。果扁圆形较小，果黄红色。果实酸度高，适应性、抗逆性强，稳产丰产性能明显，果实大小均匀，成熟期一致，便于工业化、规模化加工生产。

玉龙绯粉的品种特异性主要表现在花部和果实特征，与对照品种丽江照水比较见下表：

品种	花瓣数量	雌蕊数量	着花情况	花期	花色	果色
玉龙绯粉	15-20 个	1-3 个	繁密	12 月下旬	粉红	黄红
丽江照水梅	5 个	1 个	中密	12 月中旬	粉色	黄绿

申请品种尚未公开销售。

巨甸1号

所属的种或属：梅

培育人：张启翔 孙丽丹 王佳 潘卫华 邓黔云 张玲

申请人：北京林业大学 丽江得一食品有限责任公司 国家花卉工程技术研究中心

申请号：20140163

申请日：2014年9月24日

说明：巨甸1号为云南丽江巨甸低海拔地区（1700-1800 m）实生选育的果梅新品种。树冠开张直立，主干表面颜色为灰褐色，枝刺少，新生木质部是绿白色，花芽1-2朵着生，相对花期晚，花繁密，花梗短，花托肿大，花萼绛紫色，萼片为5-6个，花蕾白色，顶端有复色，花瓣为15-20个，重瓣浅碗型，白色，有色晕，雄蕊与花瓣约等长，雌蕊1个，柱头不外露，绿白色。果圆形且大，果实平均重53.27 g，可食率97.30%。果实酸度高，适应性、抗逆性强，稳产丰产性能明显，果实大小均匀，成熟期一致，便于工业化、规模化加工生产。

巨甸1号的品种特异性主要表现在花部和果实特征，与对照品种丽江照水比较见下表：

品种	花型	花色	花托	花期	果实可食率	果平均重
巨甸1号	重瓣	白色	肿大	1月初	97.30%	53.27 g
丽江照水	单瓣	红色	不肿大	12月中旬	88.91%	28.30 g

申请品种尚未公开销售。

锦叶女贞

所属的种或属：女贞属

培育人：范军科

申请人：范军科

申请号：20140164

申请日：2014年9月26日

说明：锦叶女贞为常绿大灌木或乔木，高可达15米。树皮平滑、灰色。叶革质，对生，卵圆形至倒卵状披针形，先端尖，基部楔形或近圆形，长6—12厘米左右，全缘，表面深绿色且具光泽无毛、背面淡绿色。自3月上旬萌芽至整个生长季嫩叶亮金黄色，近熟叶黄绿色，成熟叶绿色。花白色，顶生圆锥花序，长2—20厘米，花冠裂片与花冠筒近等长。浆果状核果长椭圆形，长约1厘米，熟时蓝黑色。6—7月开花，11—12月果熟。

申请品种与近似品种比较的主要不同点如下：

性状 \ 品名	锦叶女贞	女贞
嫩叶色	亮金黄	绿
近熟叶色	黄绿	绿

申请品种尚未公开销售。