

国家林业局植物新品种保护办公室初审公告

(第 1505 号)

按照《中华人民共和国植物新品种保护条例》和《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（林业部分）》的有关规定，现将国家林业局受理并经初审合格的植物新品种权申请公开，请申请人按照有关规定于三个月内缴纳审查费。任何人均可对其中不符合条件或不实之处，向国家林业局植物新品种保护办公室提出书面异议请求，并说明理由。

特此公告。

2015 年 07 月 06 日

彩虹银桂

所属的种或属： 桂花
培育人： 易剑雄
申请人： 易剑雄
申请号： 20150005
申请日： 2014 年 12 月 26 日

说 明：申请品种彩虹银桂是由四季桂品种演化而来。申请品种彩虹银桂为矮状灌木，新稍枝叶为玫瑰红叶片，随着生长部分叶边缘渐变成金黄色，中间由玫瑰红退变为淡绿，半年后形成褶皱反卷极不规则叶形。另外有部分叶整片变为金黄色枝叶，2-3 个月后变为花叶（金、黄、绿），半年后整叶变为深绿色，微褶皱反卷明显。

申请品种彩虹银桂与近似品种比较的不同点如下：

品种名称	叶片颜色	叶片形状
彩虹银桂	新稍为玫瑰红色，随着生长而变化，有部分叶边缘变为金黄色，中间渐变形成淡绿色后成形叶为深绿色，而有部分叶随着生长全部变为金黄色枝叶，2-3 个月后叶片变为花叶，半年后变为深绿色，	整片叶微褶皱状，叶形极不规则
云田彩桂	嫩叶边缘紫红色。随着生长而发生变化，叶片中间渐变形成浅黄与淡绿相间的色彩	椭圆形叶片较大且光滑
银碧双晖	新稍紫红色或淡紫色，幼叶边缘紫红色和粉红色，中间淡红色，随着生长逐渐变浅，边缘呈黄白色或浅黄色，中部呈灰绿色，整株树呈黄白色	椭圆形
虔南桂妃	嫩枝与新叶呈紫红、浅红、浅黄、黄绿色，。随着生长而发生变化，2 个月后全部变为绿色	叶卵状椭圆形或椭圆形带有明显锯齿
普通桂花	新稍为淡红色，随着生长，枝叶逐渐变为绿色	椭圆形

申请品种彩虹银桂尚未公开销售。

黄龙

所属的种或属：榆属
培育人：王华明 石海燕 饶放 袁向阳 王华昭 孟献旗 田耀华
申请人：遂平名品花木园林有限公司
申请号：20150002
申请日：2015 年 1 月 2 日

说 明：申请品种黄龙是 2009 年 5 月 8 日从遂平名品花木园林有限公司高竹园分场定植的新疆大叶榆中，发现一株叶片生长期黄绿色的变异枝条后扩繁选育得到。黄龙基本特征：落叶乔木。树干通直，单叶互生，叶片大，黄色，有自然光泽，色泽艳丽；叶脉清晰，质感好，基部一边楔形，一边半心形或圆，叶缘具重锯齿，齿端长、内弯。

申请品种黄龙和近似品种欧洲金叶大叶榆比较的不同点如下：

性状特征 品种名称	叶片颜色		
	春季	夏季	秋季
黄龙	黄绿色	黄绿色	黄色
欧洲金叶大叶榆	金黄色	金黄色	金黄色

申请品种黄龙尚未公开销售。

赤云相思

所属的种或属：金合欢属
培育人：曹艳云 郝海坤 申文辉 黄志玲 彭玉华 欧芷阳 何琴飞 陆国导
申请人：广西壮族自治区林业科学研究院
申请号：20150003
申请日：2015 年 1 月 6 日

说 明：申请品种赤云相思为 2010 年 8 月，马占相思×大叶相思的自然杂交种子播种后发现的特异单株经嫁接后得到的。树干树皮浅紫灰色；小枝三棱形，分枝角度<45°，光滑无毛，紫灰或紫红色；初生叶初发生时为羽状复叶，第 2、3 片叶起，羽状叶退化，叶柄演变为叶状，叶状柄长卵形或半扇形，革质有光泽，叶长 15~22cm，宽 3.5~10.0cm,具平行脉 4 条，叶面呈顺时针方向微扭,嫩叶叶尖黄绿色，叶间距短，约 3.5cm；枝、叶紧凑，冠形优美。

申请品种赤云相思与近似品种比较的不同点如下：

品种 性状	赤云相思	大叶相思	马占相思	杂交相思
小枝颜色	紫红色或紫色	绿色、灰绿	绿色	绿色、灰色、浅紫色
分枝角度	<45°	>45°	>45°	<45°或>45°
叶片大小	长 15~22cm 宽 3.5~10cm	长 10~15cm 宽 1.5~3cm	长 25cm 宽 5~10cm	长 16.5~24cm 宽 4~7cm
叶间距	约 3.5cm	约 5.5cm	约 5.5cm	约 3.8cm

叶形	宽卵形、半扇形，基部宽楔、尾部钝尖，叶面沿顺时针方向微扭。	披针形，基部窄楔，叶面平。	广披针形、长卵形，基部楔形，叶面平。	披针形、长形，基部窄楔、尾部渐尖，叶面平。
----	-------------------------------	---------------	--------------------	-----------------------

申请品种赤云相思尚未公开销售。

乐金 4 号

所属的种或属： 枣属
 培育人： 韩传明 田敬义 侯立群 王翠香 杨玲玲 刘建花 韩振虎 赵登超
 申请人： 山东省林业科学研究院 乐陵万家食品有限公司
 申请号： 20150004
 申请日： 2015 年 1 月 7 日

说 明：申请品种乐金 4 号为育种人 2006 年开始，通过发动枣农和现场调查，在乐陵市金丝小枣群体中，发现了 4 株具有抗裂果、早实、丰产、优质等特点的优株，选出并扩繁得到。申请品种乐金 4 号属鼠李科（Rhamnaceae）枣属（Zizyphus Mill）植物。落叶乔木，干性一般，树势较开张，生长势较强，树冠圆头，结果后自然开心，枝条尖削度较小，结果后自然开张。多年生枝灰褐色，二年生枝褐绿色较光滑，一年生枝段红褐色。皮孔较小，不太明显，阳面散白粉，针刺退化。二次枝自然长度 4~7 节，多年生枣股圆柱形，一般抽生枣吊 3~5 个，枣吊较长 27cm。着生叶片 13~19 片，叶片较大，叶长披针形，叶厚度 0.34mm，单叶重 0.46g，纵径 9.1cm，横径 3.7cm，叶柄 1.2cm，叶缘锯齿钝圆 3 个/cm，锯齿 30 枚。花量中，花昼开型，花冠直径 5-6mm，蜜盘黄色。果实椭圆形，平均单果重 5.95g，平均纵径 2.9cm，横径 2.2cm，果柄 0.61cm，果实大小均匀，整齐度较高。成熟果实紫红色，果面有不规则小紫斑，果顶有小凹陷和雌蕊成小尖，果皮较厚，鲜果肉绿白色，完熟时近核处红褐色。肉质细腻、致密，汁液中，风味甜，品质极上。鲜果可溶性固形物 35.36%，可滴定酸 4.11g/kg，可食率 95.5%，Vc313.8mg/100g，制干率 55.3%。干枣果皮紫红，富光泽，果形饱满，富弹性，皱纹粗而浅。成熟期连续阴雨 5 d 以上裂果率不超过 1%，丰产、优质。

申请品种乐金 4 号与近似品种金丝小枣比较的不同点如下：

品种	裂果率（%）	果实大小	成熟期
乐金 4 号	0.46	均匀	9 月下旬
金丝小枣	62.2	不均匀	9 月中下旬

申请品种乐金 4 号尚未公开销售。

富乐 96-43（FL96-43）

所属的种或属： 越桔属
 培育人： 保罗·里仁（Dr. Paul M. Lyrene）
 申请人： 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers, Inc., USA)
 申请号： 20150006
 申请日： 2014 年 12 月 28 日

说 明：申请品种富乐 96-43（FL96-43）是 1993 年 2 月在美国佛罗里达州盖恩斯维尔的育种温室内以代号为 FL93-51 的材料为母本，代号为 FL93-46 的育种材料作父本进行控制授粉杂交，选育得到。申请品种富乐 96-43（FL96-43）的主要特征特性：早熟品种，植株生长茂盛，株高

2.0m，冠幅达 2.5m；株型直立，花芽密度中，小枝数少、一年生小枝颜色绿褐；叶片卵形，长度长、宽度中，长宽比中；颜色中绿，表面有毛，边缘全缘；花序疏松，每花序小花数 6 朵，花瓣 5 裂，管状花长度中、0.8cm，花径 0.9cm；花药颜色淡粉；结果能力强，果序紧密度小，单果重 2.4g，浆果长度 1.5cm、果径 1.6cm，果形亚球形，成熟果皮颜色呈石灰层，后期转为亮蓝色，果肉色芹菜绿，表层蜡质中，果实硬度高，味道甜带微酸，质感好。

近似品种选择其母本 FL93-51 和父本 FL93-46 以及商业品种明星，其三者与申请品种的比较的不同点如下：

特性性状	植株的直立性	浆果大小、硬度	果蒂大小、果皮色
富乐 96 -43	直立	大（2.4g）、高	小、亮蓝色
母本 FL93-51		中	暗蓝色
父本 FL93-46		中、硬度中	中
明星(Star)	半直立	小（1.8g）	灰蓝色

申请品种富乐 96-43 首次于 2009 年 1 月 9 日在美国销售，中国境内至申请日前尚未销售尚未公开销售。

紫宝

所属的种或属： 榕属
培育人： 马会勤 张文 夏钰涵 张晓雷
申请人： 中国农业大学 威海经济技术开发区长寿康农民专业合作社 张晓雷
申请号： 20150007
申请日： 2015 年 1 月 19 日

说 明：申请品种紫宝为申请人于 2000 年在山东威海荣城市白港西镇白港西村山坡地的一株 6 年生的青皮无花果树典型的绿色突变成黑紫色，申请人将枝条剪下进行扦插，并扩繁得到。申请品种紫宝的特征特性：主干树皮颜色为棕色、不光滑，树姿生长特征为半直立，冠型为分支型，树势为中，新梢颜色为浅绿色，一年生休眠枝茸毛为多，一年生休眠枝粗度：10.8mm，一年生休眠枝节间长度：4.2cm，一年生休眠枝皮孔多少：11；叶片长为 21.4cm，宽为 18.9cm，叶片生长方向为斜向上，叶片颜色为深绿，叶面状态为抱合，叶柄长为 10.5cm；果实形状为扁圆形，果棱数量为 11-16，果实最大横径位置为中间，果皮底色为琥珀色，果皮盖色为紫色，盖色强度为强，主色类型为片状，着色程度为深，胴面果锈为少、蜡质为中，果粉为多，果孔为中，果肉颜色为紫红、果肉质地为松软，果肉硬度为软，果汁含量为多，假种子数量为多；果实直径为 33.6mm；春果成熟时间为 7 月 10 日—7 月底，重量为 35g-60g，秋果成熟时间：8 月 20 日—10 月底，重量为：25g-50g。

申请品种紫宝与近似品种青皮比较的不同点：

性状	紫宝	青皮
果皮颜色	紫黑色	绿色
果实平均直径	33.6mm	39.5mm
平均单果重	33.4g	37.9g

申请品种紫宝尚未公开销售。

麦缘锦楸

所属的种或属： 梓树属
培育人： 张守攻 王军辉 李平英 马建伟 张宋智 麻俊文 韩云花
申请人： 中国林业科学研究院林业研究所 甘肃省小陇山林业实验局林业科学研究所
申请号： 20150008
申请日： 2015 年 1 月 15 日

说 明：申请品种麦缘锦楸为育种人 2009 年在灰楸主要分布区泾河流域、渭河流域、汾河流域收集优树种子 114 份，2010 年播种育苗，在 cw03（采自陕西省咸阳市长武县彭头镇方庄村行道树优良单株）家系苗中发现 1 株天然变异株，2011 年将该变异苗嫁接无性系化后，进行了无性系苗圃测定，2013 年和 2014 年继续嫁接扩繁并选育得到。申请品种麦缘锦楸为落叶乔木，树冠卵形；主干通直，树皮为灰绿色，皮孔小，菱形，部分皮孔连生，密度高，凸起明显；叶片阔卵形，叶缘三深裂，先端渐尖，基部平截，有不规则锯齿。申请品种紫缘荷尚未公开销售。

申请品种麦缘锦楸与近似种普通灰楸比较的不同点如下：

品种	叶片性状	树干皮孔
麦缘锦楸	叶片边缘呈金黄色	较小
普通灰楸	叶片绿色	较大

申请品种麦缘锦楸尚未公开销售。

龙仪芳

所属的种或属： 樟属
培育人： 陈乐文 孙秀泉 洪伟 金祥荣 吴世华 汤林刚
申请人： 宜兴市香都林业生态科技有限公司
申请号： 20150009
申请日： 2015 年 1 月 21 日

说 明：申请品种龙仪芳属于樟属，于 2010 年 5 月从浙江省杭州市西湖边的亚热带气候的樟树自然授粉群体中获得，人工运输至云南西双版纳热带雨林气候带进行培育发现的特异类型母树的枝条扦插培育而成。申请品种龙仪芳的特异性：樟树是常绿大乔木，四季常绿，树皮灰褐色或黄褐色，小枝淡褐色，光滑；叶互生，革质，卵状椭圆形以至卵形，长 7~15cm，宽 5~9cm，卵型，先端尖；边缘轻微内卷；全缘或呈波状，上面深绿色有光泽，下面灰绿色，无毛，叶背面无白粉，嫩芽幼叶深红色，脉在基部以上 3 出，脉腋内有隆起的腺体；花小，绿白色，长约 2mm；花被 5 裂，椭圆形，长约 3mm；子房卵形，光滑无毛，花柱短；柱头头状。核果球形，熟时紫黑色，果托杯状，果梗不增粗。花期 2-4 月。果期 6-8 月。

申请品种龙仪芳与近似品种龙脑 1 号及龙脑樟 L-1 及普通樟树比较的不同点如下：

		龙仪芳	龙脑樟 L-1（新晃）	龙脑1号(吉安)	普通樟树
外观特征	树皮	幼时平滑，成熟纵裂。	平滑	纵裂	纵裂
	叶生	叶互生	叶互生	叶对生或近对生	叶对生或近对生
	叶形及大小	卵型，先端尖；边缘轻微内卷；长7~15cm，宽5~9cm 叶背面无白粉，嫩芽幼叶深红色	先端骤短渐尖或长渐尖，尖头常呈镰形，边缘内卷；长6~12cm，宽3.5~6.5cm	先端尖；边缘微波状；长6~12cm，宽2.5~5.5cm	先端尖；边缘微波状；长3~10cm，宽2~4.5cm，背面有白粉。嫩芽幼叶青绿色
	叶脉	离基三出脉	通常羽状脉	离基三出脉	通常羽状脉

申请品种龙仪芳尚未公开销售。

虹光

所属的种或属： 枣

培育人： 刘平 王玖瑞 刘孟军 徐娟 石庆华 胡兰

申请人： 河北农业大学

申请号： 20150010

申请日： 2015 年 1 月 22 日

说 明：申请品种虹光为是利用秋水仙素对月光进行染色体加倍获得的同源四倍体新种质。申请品种虹光为多年生乔木，树姿较直立，树势中等，树冠圆头型；新枣头红褐色，针刺不发达；叶片阔卵圆形，深绿色，基部三出脉，叶基圆形，叶尖锐尖，叶缘具锐锯齿；花为日开型，花蕾大；果实近圆柱形，果皮红色，风味浓。

申请品种虹光与近似品种月光比较的不同点如下：

品种	体细胞染色体倍性	叶片形状	叶形指数	叶片颜色	叶缘	叶片厚度	花蕾直径（cm）	果形	单果重（g）
虹光	4x	阔卵圆形	1.82	深绿色	有皱褶	厚	0.35	近圆柱形	12.6
月光	2x	卵状披针形	2.73	绿色	平展	中等	0.29	橄榄形	7.3

申请品种虹光于尚未公开销售。

日光

所属的种或属： 枣

培育人： 刘孟军 刘平 蒋洪恩 王玖瑞 吴改娥 胡兰

申请人： 河北农业大学

申请号： 20150011

申请日： 2015 年 1 月 22 日

说 明：申请品种日光是利用秋水仙素对冬枣主芽进行染色体加倍获得的同源四倍体新种质。申请品种日光为纯合四倍体，多年生乔木，树姿开张，成枝力强，树冠圆头型；新枣头红褐色，无针刺；叶片阔卵圆形，深绿色，基部三出脉，叶基截形，叶尖钝尖，叶缘具锐锯齿；花为日开型，花蕾大；果实扁圆形，果皮红色，风味浓。

申请品种日光与近似品种冬枣比较的不同点如下：

品种	体细胞染色体数目	叶片形状	叶形指数	叶片颜色	叶缘	叶片厚度	花蕾直径(cm)	果形	果顶	单果重(g)
日光	48	阔卵圆形	1.88	深绿色	有皱褶	厚	0.33	扁圆形	凹	20.7
冬枣	24	卵状披针形	2.72	绿色	平展	中等	0.28	近圆形	平	14.5

申请品种日光尚未公开销售。

珠光

所属的种或属： 枣
 培育人： 刘孟军、刘平、石庆华、王玖瑞
 申请人： 河北农业大学
 申请号： 20150012
 申请日： 2015 年 1 月 22 日

说 明：申请品种珠光是利用秋水仙素对邢台 0604 进行染色体加倍获得的四倍体酸枣新种质。申请品种珠光为多年生乔木，树姿开张，树势中等，树冠圆头型；新枣头红褐色，针刺发达；叶片卵圆形，深绿色，基部三出脉，叶基圆形，叶尖尖凹，叶缘具锐锯齿；花为日开型，花蕾大；果实扁圆形，果皮赭红色。

申请品种珠光与近似品种邢台 0604 比较的不同点如下：

品种	体细胞染色体倍性	叶片形状	叶形指数	叶片颜色	叶缘	叶片厚度	花蕾直径(cm)	果形	果点	单果重(g)
珠光	4x	卵圆形	1.81	深绿色	有皱褶	厚	0.30	扁圆形	明显	5.9
邢台 0604	2x	椭圆形	2.02	绿色	平展	中等	0.27	近圆形	不明显	4.0

申请品种珠光尚未公开销售。

荣兴

所属的种或属： 枫香属
 培育人： 周卫荣 周建荣 周卫信 王樟富 方腾
 申请人： 德兴市荣兴苗木有限责任公司
 申请号： 20150013
 申请日： 2014 年 1 月 24 日

说 明：申请品种荣兴为 2010 年 6 月，选育人在普通枫香播种小苗（种子源自购买，产地不明）苗圃中发现多株全株叶子紫色的变异植株，当年 7 月采集实生苗枝条进行扦插得到。申请品种荣兴为高大落叶乔木；树皮灰白色，韧皮部紫色；嫩枝紫色；叶薄革质，阔卵形，掌状五深裂（偶三深裂），长 8-14 cm，宽 6-12 cm，中裂片明显长于侧裂片，长倒卵圆形或长椭圆形；初展叶紫黑色，嫩叶紫红色，成熟叶绿色；托叶线状披针形，宽 1.5-2mm，长 2-3 cm，游离（或与叶柄连生），紫色。

申请品种荣兴与近似品种比较的不同点如下：

种类 对比项	荣兴	普通枫香	金钰	福禄紫枫	北美枫香
叶形	掌状五深裂（偶三深裂），中裂片几近侧裂片 2 倍长，长倒卵圆形或长椭圆形	掌状 3-5 中裂，中裂片稍长，但远不及侧裂片 2 倍长，卵形至卵状披针形	掌状五裂，裂片深度中等	掌状三中列（偶五中裂），中裂片稍长，但远不及侧裂片 2 倍长，卵形至卵状披针形	掌状五深裂，中裂片稍长，但远不及侧裂片 2 倍长，卵形至卵状披针形
叶色	初展叶紫黑色，嫩叶紫红色，成熟叶绿色	绿色	嫩叶金黄色	嫩叶紫黑色，成熟叶正面紫色，背面紫红色	嫩叶绿色，成熟叶绿色，秋叶红色
嫩枝	紫色	绿色	金黄色	紫色	绿色
韧皮部	紫色	绿色	绿色	紫色	绿色

申请品种荣兴尚未公开销售。

尚德

所属的种或属： 枫香属

培育人： 周卫信 方腾 周卫荣 周建荣 王樟富

申请人： 德兴市荣兴苗木有限责任公司

申请号： 20150014

申请日： 2015 年 1 月 24 日

说 明：申请品种尚德 1998 年 5 月，选育人在普通枫香播种小苗（种子源自购买，产地不明）苗圃中发现 1 株全株叶片小，节间短，叶色呈紫色的变异植株，采集枝条进行嫁接和扦插扩繁得到。申请品种尚德为高大落叶乔木；树皮灰白色，韧皮部紫色；嫩枝紫色，节间短，半木质化枝条具毛；叶片小，薄革质，阔卵形，掌状五深裂（偶三深裂），长 5-8 cm，宽 5-8 cm，中裂片明显长于侧裂片，长倒卵圆形或长椭圆形；紫色；托叶线状披针形，宽 1.5-2mm，长 2-3 cm，游离（或与叶柄连生），紫色。

申请品种尚德与近似品种比较的不同点如下：

种类 对比项	尚德	普通枫香树	金钰	福禄紫枫	北美枫香
叶片形状	掌状五深裂（偶	掌状 3-5 中裂，	掌状五裂，	掌状三中列（偶	掌状五深裂，

	三深裂),中裂片较长,长倒卵圆形或长椭圆形	中裂片稍长,卵形至卵状披针形	裂片深度中等	五中裂),中裂片稍长,卵形至卵状披针形	中裂片稍长,卵形至卵状披针形
叶片大小	长 5-8cm 宽 5-8cm	长 8-16cm 宽 8-12cm	长 8-16cm 宽 8-12cm	长 8-16cm 宽 8-12cm	长 8-16cm 宽 8-12cm
叶色	嫩叶紫黑色 成熟叶紫色	绿色	嫩叶金黄色	嫩叶紫黑色 成熟叶紫色	嫩叶绿色 成熟叶绿色 秋叶红色
嫩枝颜色	紫色	绿色	金黄色	紫色	绿色
半木质化枝条	具毛	无或早落	无或早落	无或早落	无或早落
节间长度	5cm 以下	5cm 以上	5cm 以上	5cm 以上	5cm 以上
韧皮部	紫色	绿色	绿色	紫色	绿色

申请品种尚德尚未公开销售。

怀玉

所属的种或属： 山茶属

培育人： 周建荣 周卫荣 周卫信 王樟富 方腾

申请人： 德兴市荣兴苗木有限责任公司

申请号： 20150015

申请日： 2014 年 1 月 24 日

说 明：申请品种怀玉为 2007 年 8 月，选育人在浙江红山茶种子育苗圃地中发现一株叶色有色斑，次年春把该株有叶色变异的植株芽苗嫁接得到。申请品种怀玉为灌木至小乔木。小枝灰褐色至灰白色。叶片厚革质，通常长圆形，无毛；叶片颜色深绿色，有光泽， 90%以上叶片具色斑，色斑形状不甚规则，多自基部开始沿中脉两侧分布，一般与中脉相连但极少达叶缘；自初展叶至成熟叶色斑呈黄绿色至草绿色变化趋势；叶片初展时色斑与其他部位色差小，不甚明显；嫩叶期色斑呈黄绿色；成熟叶色斑逐渐变为草绿色。

申请品种怀玉与近似种浙江红山茶比较的不同点如下：

种类		怀玉	浙江红山茶
对比项			
叶形		长圆形	长圆形，倒卵状椭圆形至倒卵形，变异较大
叶色	初展叶	黄绿色，具不明显色斑	黄绿色，绿色或紫红色，无色斑
	嫩叶	绿色，具明显色斑，色斑颜色黄绿色	绿色，不具色斑
	成熟叶	深绿色，具明显色斑，色斑颜色草绿色	深绿色，不具色斑

申请品种怀玉尚未公开销售。

吉祥厚朴

所属的种或属： 木兰属
 培育人： 范继才 易同培
 申请人： 范继才 易同培
 申请号： 20150016
 申请日： 2015 年 1 月 24 日

说 明：申请品种吉祥厚朴属凹叶厚朴的芽变植株，后在都江堰等地嫁接和优选培育得到。申请品种吉祥厚朴为落叶乔木，高达 20 米左右；树皮灰色或灰褐色，不开裂，嫩枝被绢状毛；叶片大型，生枝顶，近革质，椭圆状倒卵形，长 24-45cm，宽 10-24cm，聚生枝顶，先端有一凹缺，形成 2 裂片，下面灰绿色，被柔毛，有白粉，侧脉多达 35 对。花叶同时开放，花被片 9-12（17），红色，芳香，雄蕊群螺旋状着生，花药淡红色，雌蕊群淡红色。聚合果长圆状卵形，长达 15cm，直径达 6cm。花期 4-6 月；果期 9-10 月。

申请品种吉祥厚朴与近似种凹叶厚朴比较的不同点如下：

性状	吉祥厚朴	凹叶厚朴
落叶习性	落叶乔木	落叶乔木
花被片	红色	白色
柱头	淡红色	淡红色
芳香	芳香	芳香
花期	4-6 月	4-5 月

申请品种吉祥厚朴尚未公开销售。

红玉含笑

所属的种或属： 含笑属
 培育人： 罗泽治 范继才 易同培
 申请人： 范继才 罗泽治 易同培
 申请号： 20150017
 申请日： 2015 年 1 月 24 日

说 明：申请品种红玉含笑是 2006 年春季在湖南通道县山区大面积深山含笑林中发现，为深山含笑的芽变植株。申请品种红玉含笑常绿乔木，树高可达 15-20 米；全株无毛；树皮浅灰色；芽、嫩枝、叶背、苞片均多少被白粉。叶革质，长圆状椭圆形，长 8-12cm，宽 3-6cm，先端骤狭短渐尖或短渐尖，基部楔形、宽楔形；叶柄无托叶痕。花极芳香，1-2 个生于叶腋；花被片 7-9，上部淡红色，下部深紫红色，长 4.5-5cm，宽 1.5-2.4cm；雄蕊深紫红色，长 1.7cm-2.2cm，花丝长 6-8mm，心皮连柱头紫红色，长 2.5-5mm。花期 2-4 月，偶有二次开花时间为 6-8 月，果期 8-10 月。

申请品种红运含笑与近似种深山含笑比较的不同点如下：

性状	红运含笑	深山含笑
落叶习性	常绿乔木	常绿乔木
花被片	上部淡红色，下部深紫红色	白色或基部略带淡红色

柱头	紫红色	淡黄色
芳香	芳香	芳香
花期	2-4 月，偶见二次花 6-8 月	2-3 月

申请品种红玉含笑尚未公开销售。

东岳红

所属的种或属： 蛇葡萄属
 培育人： 孙居文 臧德奎 韩克杰 杜明芸 方晓晓 姜丽娜
 申请人： 山东农业大学
 申请号： 20150018
 申请日： 2015 年 1 月 27 日

说 明：申请品种东岳红为葎叶蛇葡萄的自然变异。申请品种东岳红为大型木质藤本；幼枝、幼卷须和幼花序枝均为紫红色，卷须与叶对生。单叶互生，新叶紫红色，成熟叶褐绿色、绿色，3~5掌状浅裂、中裂或深裂，有光泽，无毛。花两性，聚伞花序与叶对生，花淡黄色；萼杯状；花瓣5；雄蕊5。浆果球形，熟时蓝紫色。花期6~8月，果熟期9~10月。

申请品种东岳红与近似种葎叶蛇葡萄比较的不同点如下：

品种	新叶颜色	幼枝颜色	幼卷须颜色	幼花序枝颜色
东岳红	紫红色	紫红色	紫红色	紫红色
葎叶蛇葡萄	黄绿色、淡绿色或带红晕	黄绿色、淡绿色或带红晕	黄绿色、淡绿色	黄绿色、淡绿色

申请品种东岳红尚未公开销售。

绿玥

所属的种或属： 核桃属
 培育人： 沙德伟 杨利民 贾建 张继勇 裴东 何波 文明 谭兴荣 罗斌 苏德忠 张俊佩
 申请人： 会理县林业局 中国林业科学研究院林业研究所 凉山彝族自治州林业局
 申请号： 20150019
 申请日： 2015 年 1 月 28 日

说 明：申请品种绿玥是在凉山州进行核桃资源普查时发现的早熟型实生核桃优株并扩繁得到。申请品种绿玥树势强健，树姿开张，树冠半圆形；树干通直、灰白色、深纵裂；一年生枝灰褐色，表面光滑，节间短，皮孔小且密；奇数羽状复叶，小叶 5~13 片，多 7~9 片，叶尖渐尖，叶缘全缘；侧花芽结果枝数 1~3 个，单枝结果数 3~4 个，多 3 果，连续结果能力强；坚果圆形，果顶稍尖，果底稍突，壳面刻窝少且浅，缝合线较平；平均单果重 13.31g，坚果平均纵径 4.07cm、横径 3.42mm、侧径 3.68mm、壳厚为 1.16cm。内褶壁退化，横隔膜膜质，易取整仁，出仁率 51%；核仁较饱满，仁色浅黄，风味浓郁，口感好。

申请品种绿玥与近似品种三台核桃比较的不同点如下：

品种	绿玥	三台核桃
表型特征		
小叶数	5~13 片	9~11 片

每花序着生雌花数	3~8朵, 以3~4朵为主	1~4朵, 以2~3朵为主
果实成熟期	6月下旬或7月上旬	9月下旬

申请品种绿玥尚未公开销售。

紫玥

所属的种或属: 核桃属

培育人: 沙德伟 杨利民 贾建 张继勇 裴东 何波 文明 谭兴荣 罗斌 苏德忠 张俊佩

申请人: 会东县林业局 中国林业科学研究院林业研究所 凉山彝族自治州林业局

申请号: 20150020

申请日: 2015年1月28日

说明:申请品种紫玥是2005年会东县林业局资源调查时发现的一株优良核桃单株并扩繁得到。申请品种紫玥亲本树势强, 主干不明显, 多分枝, 树皮灰白色纵裂, 树冠伞半圆形, 40年生树高6.4m, 干径41cm。分枝力强, 分枝角大于30°。一年生枝灰褐色, 光滑无毛, 节间短。皮中等, 乳白色。枝顶芽(叶芽)较大, 圆锥形; 腋芽贴生, 圆球形, 密被白色茸毛。主、副芽离生明显。奇数羽状复叶, 顶叶多退化, 小叶5~11片, 多9片, 叶片阔披针形, 叶基椭圆形, 叶尖渐尖, 背面无毛, 叶柄极短。坚果中等偏大、长椭圆形, 平均单果重13.96g, 果形大小均匀一致, 三径分别为纵径40.7mm、横径37.2mm、侧径34.4mm, 果面刻窝多而均匀, 缝合线低平, 果顶较突出。取仁较易, 出仁率56.86%, 种仁饱满, 风味无涩, 仁色紫色。‘紫玥’于3月中旬叶片开始萌动, 3月下旬展叶, 雄花期3月下旬, 雌花期4月上旬, 属雄先型。果序座果数1~3个, 多为2个。果实10月中下旬成熟, 11月上旬落叶。该亲本40年生树体生长旺盛, 嫁接亲和力强, 是一个优良核桃品种。

申请品种紫玥与近似品种三台核桃比较的不同点如下:

品种 表型特征	紫玥	三台核桃
小叶数	5~11片	9~11片
每花序着生雌花数	1~3朵, 以2朵为主	1~4朵, 以2~3朵为主
果实成熟期	10月下旬	9月下旬
果仁颜色	紫色	浅黄白色

申请品种紫玥尚未公开销售。

京亮1号

所属的种或属: 丁香属

培育人: 冷平生 窦德泉 郑健 胡增辉 杨晓红

申请人: 北京农学院

申请号: 20150021

申请日: 2015年1月29日

说明:申请品种京亮1号为华北紫丁香上发现黄色叶片的突变枝条经扩繁获得。申请品种京亮1号为落叶灌木。树皮暗灰色, 枝条灰色, 芽卵形, 芽鳞绿色或黄绿色; 单叶互生, 卵圆形,

卷曲，基部圆形、心形或截形，新叶黄色或黄绿色，成叶黄色；圆锥花序，花冠白色。蒴果椭圆形；花期 4-5 月，果期 9-10 月。

申请品种京亮 1 号与近似种华北紫丁香比较的不同点如下：

性状	京亮 1 号	华北紫丁香
芽鳞	绿色	紫色
新叶	黄色或粉黄色	紫红色
成叶	黄色或黄绿色	绿色
花蕾	白色或浅黄色	紫红色
花色	白色	紫色

申请品种京亮 1 号尚未公开销售。

黄金贞 2 号

所属的种或属：女贞属
培育人：潘常智
申请人：潘常智
申请号：20150022
申请日：2015 年 1 月 31 日

说 明：申请品种黄金贞 2 号为 2005 年 1 月浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇从实生苗中发现变异植株，是黄金贞 1 号籽播实生苗中发现的一个新品种。申请品种黄金贞 2 号是常绿灌木，高 1.5-3 米，小枝具短柔毛，基部楔形，全缘，叶柄有短柔毛，大多叶长 1.5-2.7cm，宽 1.1-1.8cm，小枝细、结间短向外散开，树形紧凑、密集、老叶不反清，叶四季金黄或纯黄，有光泽。叶初始时，叶、芽、枝通体金黄色，后期有黄色老叶换叶落叶发新枝，一年四季金黄或纯黄色。

申请品种黄金贞 2 号与近似品种黄金贞 1 号比较的不同点：

	黄金贞 2 号	黄金贞 1 号
叶	小	大
枝	结间短、枝条铺散	细长向下垂

申请品种黄金贞 2 号尚未公开销售。

黄金贞 3 号

所属的种或属：女贞属
培育人：潘常智
申请人：潘常智
申请号：20150023
申请日：2015 年 1 月 31 日

说 明：申请品种黄金贞 3 号 2005 年 1 月浙江省绍兴市齐贤镇从实生苗中发现变异植株，是黄金贞 1 号籽播实生苗中发现的一个新品种。申请品种黄金贞 3 号是常绿灌木，高 1.5-3 米，小枝

具短柔毛，基部楔形，全缘，叶柄有短柔毛，大多叶长 1.8-4cm，宽 1.3-2.5cm，树形紧凑、密集、金黄色，有光泽。叶初始时，叶、芽、枝通体金黄色，后期有黄色老叶换叶落叶发新枝，一年四季金黄，冬季金黄或红紫色。

申请品种黄金贞 3 号与近似品种黄金贞 1 号比较的不同点：

	黄金贞 3 号	黄金贞 1 号
叶	冬季金黄或红色	四季金黄
枝	枝条铺散	细长向下垂

申请品种黄金贞 3 号尚未公开销售。

德瑞斯红四（DrisRaspFour）

所属的种或属： 悬钩子属
培育人： 卡洛斯·D·费尔（Carlos D. Fear） 理查德·E·哈里森（Richard E. Harrison）
申请人： 德瑞斯克草莓联合公司
申请号： 20150024
申请日： 2015 年 2 月 3 日

说 明：申请品种 1999 年以覆盆子品种托拉（Tola）为母本，以编号 R605.1 为父本进行人工定向杂交选育获得。申请品种德瑞斯红四（DrisRaspFour）的特征特性：植株直立生长，当年生枝条数量为多，极嫩枝快速生长时花青素显色、显色强度为中，当年生枝条表面粉状程度为中、花青素显色程度为弱、节间长度为长，当年生枝条上叶芽长度为中，为夏季去年生枝条上坐果、秋季在当年生枝条坐果的品种，休眠枝长度为长，休眠枝颜色为灰棕色，当年生枝条长度为短，枝条刺密度为密，刺基部极小、刺为短，刺颜色为绿色，叶片为暗绿色，叶片主要为三至五小叶，叶片皱褶程度为中，两侧小叶相对位置为相叠，顶端小叶长度为中、宽度为中，花梗刺数量为无或极少，花梗无花青素显色，花大小为大，坐果枝方向为直立、长度为长，果实长度为中、宽度为中，果实长宽比为中，果实侧面形状为宽圆锥形，单个核果大小为中，果实颜色为深紫色，果实光泽度为中，果实紧实程度为中到紧，叶芽萌发时间为晚，开花时间为中，果实成熟时间为中，去年生枝结果期为中，当年生枝结果期为长。

申请品种德瑞斯红四与近似品种德瑞斯克帕西菲卡（Driscoll Pacifica）的不同点：

性状	德瑞斯克帕西菲卡	德瑞斯红四
植株大小	中	极大
托叶姿态	抱茎	直立
花大小	中	大
果实光泽	弱	中
果实小核果数量	116	97
每粒种子平均重量（mg）	1.42	3.36

申请品种德瑞斯红四（DrisRaspFour）于 2009 年 12 月 20 日在澳大利亚销售，中国境内申请日前未销售。

德瑞斯黑四（DrisBlackFour）

所属的种或属： 悬钩子属

培育人：加文·R·西尔斯（ Gavin R. Sills） 乔治· 罗德里格斯· 阿卡沙（Jorge Rodriguez Alcazar ）
何塞·穆里洛·罗德里格兹·梅萨 （Jose Maurilio Rodriguez Mesa ）
安德烈 M. 加彭（Andrea M. Pabon ）

申请人：德瑞斯克草莓联合公司

申请号：20150025

申请日：2015 年 2 月 3 日

说 明：申请品种德瑞斯黑四以黑莓品种睡美人（Sleeping Beauty）为母本，以编号 BH917-6 为父本进行人工定向杂交选育获得。申请品种德瑞斯黑四的特征特性：植株直立生长，当年生枝条数量为多，休眠枝长度为长、直径为中，休眠枝花青素显色为弱，休眠枝分枝数量为多，分枝分布在整个休眠枝上，休眠枝横截面形状为圆形，休眠枝上有刺、刺数量为少、大小为大，刺的着生角度为向外，快速生长嫩枝花青素显色为中，极嫩枝快速生长时花青素显色强度为中、绿色强度为中，嫩枝绒毛数量为无或极少，顶端小叶长度为中、宽度为中，小叶叶缘为双锯齿、为浅锯齿，小叶主要数量为三小叶羽状复叶，叶片上表面绿色为深、光泽度为弱，叶柄托叶大小为中，花直径为中、花颜色为白色，果实宽度为中、长度为中，果实长宽比为大，果实小核果数量为中、小核果大小为中，果实纵切面形状为长圆锥形，果实颜色为黑色，叶芽萌发时间为晚，果实在当年生枝结果，去年生枝条上开花始期为晚、果实成熟期为中，当年生枝条开花始期为晚、果实成熟期为晚。

申请品种德瑞斯黑四（DrisBlackFour）与近似品种睡美人（Sleeping Beauty）的不同点：

性状	睡美人	德瑞斯黑四
休眠枝横截面形状	有棱和槽	圆形
果实紧实程度	中	极紧实
果实形状	椭圆形	长圆锥形

申请品种德瑞斯黑四（DrisBlackFour）于 2011 年 12 月 23 日在墨西哥销售，中国境内申请日前未销售。

德瑞斯蓝四（DrisBlueFour）

所属的种或属： 越桔属

培育人：布赖恩·K·卡斯特（Brian K. Caster） 珍妮弗·K·伊佐（Jennifer K. Izzo）
阿伦·德雷珀（Arlen Draper）

申请人： 德瑞斯克草莓联合公司

申请号： 20150026

申请日： 2015 年 2 月 3 日

说 明：申请品种德瑞斯蓝四（DrisBlueFour）以编号 FL 97-26 为母本，以编号 MS139 为父本进行人工定向杂交，杂交选育获得。申请品种德瑞斯蓝四（DrisBlueFour）的特征特性：植株长势为中到强，植株半直立生长，一年生枝条颜色为中黄绿色，叶片长度为中、宽度为中，叶片形状为椭圆形，叶片上表面颜色为深黄绿色，叶全缘，花芽花青素着色为中，花序长度为中，花冠形状为瓮状，花冠筒大小为中，花冠筒花青素着色为无或极弱，花冠筒有皱褶，花簇密度为中，未成熟果实绿色为中，果实大小为中到大，果实纵切面形状为扁圆形，果实萼片姿态为直立、萼片类型为内弯，果实萼孔直径为中、深度为中，果实果皮颜色为深灰紫，果实紧实、甜度为中、酸度为低，结果枝为一年生枝条，一年生枝条开花期为中，果实成熟期为早到中。

申请品种德瑞斯蓝四（DrisBlueFour）与近似品种德瑞斯蓝二（DrisBlueTwo）的不同点：

性状	德瑞斯蓝四	德瑞斯蓝二
叶片基部形状	向下	下弯带钩
叶片边缘形状	全缘	细锯齿状
果实形状	接近球形	扁圆形
果霜强度	强	弱

申请品种德瑞斯蓝四（DrisBlueFour）于 2012 年 01 月 19 日在美国销售，中国境内申请日前未销售。

婉醉

所属的种或属： 紫薇属

培育人： 张启翔 徐婉 蔡明 石俊 王轲 潘会堂 程堂仁 王佳 吴桂昌 刘坤良 符秀玉

申请人： 北京林业大学 国家花卉工程技术研究中心

申请号： 20150028

申请日： 2015 年 2 月 3 日

说明：申请品种婉醉为 2008 年 7 月在北京林业大学小汤山资源圃以无香的白云映霞（*Lagerstroemia indica* ‘Bai Yun Ying Xia’）为母本，香花的尾叶紫薇（*L. caudata*）为父本进行远缘杂交，收集杂种 F₁ 代种子播种，2011 年从 F₁ 代群体中筛选出淡香的编号为 X11 的优良单株（母本）与无香的 *L. indica* ‘Berlingot Menthe’（父本）进行杂交后选育得到。申请品种婉醉基本特征：小乔木，枝干直立，萌蘖性弱。2 年生苗株高 1.5m，冠幅 68-75cm。干皮棕褐色，剥落。小枝四棱明显，微具翅。叶片椭圆形，长 4.7cm，叶片宽 3.1cm。花萼长 0.9-1.1cm，花萼棱明显，无毛。花蕾圆锥形，缝合线中等突起。花序长达 19cm，宽 17cm，每花序着花数 70-90 朵。花径 3.6-3.8cm，花瓣上部主要颜色为紫红色 (Red-Purple N74A)，花瓣长 1.1-1.3cm，宽 1.0-1.2cm，花瓣边缘褶皱明显，瓣爪粉色，长 0.6cm。花香浓郁。花期 6-8 月。果椭圆形，长 1.2cm，宽 0.9cm，果期 8-10 月。

申请品种婉醉与近似品种红霞的不同点：

	‘婉醉’	‘红霞’
花：花瓣上部主要颜色	Red-Purple N74A	Purple N78A
花：花香	花香浓郁	无香味

申请品种婉醉尚未公开销售。

婉紫

所属的种或属： 紫薇属

培育人：张启翔 徐婉 蔡明 石俊 叶远俊 王轲 潘会堂 程堂仁 王佳 吴桂昌 刘坤良 符秀

申请人： 北京林业大学 国家花卉工程技术研究中心

申请号： 20150029

申请日： 2015 年 2 月 3 日

说明：申请品种婉紫为 2008 年 7 月在北京林业大学小汤山资源圃以白色的尾叶紫薇（*Lagerstroemia caudata*）为母本，白色的白云映霞（*L. indica* ‘Bai Yun Ying Xia’）为父本进行远缘杂交，于当年收集杂种播种，从 F₁ 代群体中筛选出白色的编号为 X22 的优良单株（母本）与复色品种 *L. indica* ‘Berlingot Menthe’（父本）进行杂交选育得到。申请品种婉紫基本特征：灌木，枝干丛生，萌蘖性强。2 年生苗株高 1.3m，冠幅 40-50cm。干皮灰褐色，剥落。小枝四棱明显，微具翅。叶片椭圆形，长 3.3cm，宽 2.3cm。花萼长 0.8-1.0cm，花萼棱明显，无毛。花蕾圆锥形，缝合线中等突起。花序长 18cm，宽 15cm，每花序着花数约 50-70 朵。花径 3.5-4.1cm。

花复色，花瓣上部主要颜色为紫色(Purple N78B)，花瓣上部次要颜色为(White NN155C)。花瓣长 0.9-1.2cm，宽 1.1-1.4cm，花瓣边缘明显褶皱，瓣爪与瓣上部主要颜色同色，长 0.7cm。花具淡香。花期 8-10 月。果实椭圆形，长 0.9cm，宽 0.8cm，果期 9-11 月。

申请品种婉醉与近似品种 *Prairie Lace* 的不同点：

	婉紫	<i>Prairie Lace</i>
花：花瓣上部主要颜色	Purple N78B	Red-Purple 58B
花：花香	淡香	无香味

申请品种婉紫尚未公开销售。

婉香

所属的种或属： 紫薇属

培育人：张启翔 蔡明 徐婉 石俊 叶远俊 王轲 潘会堂 程堂仁 王佳 吴桂昌 刘坤良 符秀玉

申请人： 北京林业大学 国家花卉工程技术研究中心

申请号： 20150030

申请日： 2015 年 2 月 3 日

说明：申请品种婉香为 2008 年 7 月在北京林业大学小汤山资源圃以无香的白云映霞 (*Lagerstroemia indica* ‘Bai Yun Ying Xia’) 为母本，浓香的尾叶紫薇 (*L. caudata*) 为父本进行远缘杂交，收获种子后播种，2011 年从 F₁ 代群体中筛选出淡香的编号为 X4 的优良单株(母本)与无香的 *L. indica* ‘Petite Pink’ (父本) 进行杂交后选育得到。申请品种婉香基本特征：小乔木，枝干直立至灌木状，萌蘖性弱。2 年生苗株高 1.4m，冠幅 88cm-97cm。干皮棕褐色，剥落。小枝四棱明显，微具翅。叶片椭圆形，长 4.6cm，宽 2.7cm。花萼长 0.8-1.1cm，花萼棱明显，无毛。花蕾圆锥形，缝合线中等突起。花序长达 20cm，宽 16cm，每花序着花数 60-80 朵。花径 3.8-4.2cm，花瓣上部主要颜色为紫色 (Purple 77B)，花瓣长 1.3-1.5cm，宽 1.1-1.2cm，花瓣边缘皱褶不明显，瓣爪粉色，长 0.6cm。花香浓郁。花期 7-9 月。果椭圆形，长 1.2cm，宽 1.0cm，果期 9-11 月。

申请品种婉香与近似品种紫晶的不同点：

	婉香	紫晶
花：花瓣上部主要颜色	Purple 77B	Purple-Violet N80C
花：花香	花香浓郁	无香味

申请品种婉香尚未公开销售。

婉粉

所属的种或属： 紫薇属

培育人：张启翔 蔡明 徐婉 石俊 叶远俊 王轲 潘会堂 程堂仁 王佳 吴桂昌 刘坤良 符秀玉

申请人： 北京林业大学 国家花卉工程技术研究中心

申请号： 20150031

申请日： 2015 年 2 月 3 日

说明：申请品种婉粉为 2008 年 7 月在北京林业大学小汤山资源圃以白色的尾叶紫薇 (*Lagerstroemia caudata*) 为母本，粉色的多花粉 (*L. indica* ‘Duo Hua Fen’) 为父本进行远缘杂交，收获种子后播种，2011 年，从 F₁ 代群体中筛选出紫色的编号为 X19 的优良单株(母本)与

复色品种 *L. indica* ‘Berlingot Menthe’（父本）进行杂交后选育得到。申请品种婉粉基本特征：小乔木，枝干直立至灌木状，萌蘖性弱。2年生苗株高约 1.5m，冠幅 65-75cm。干皮灰褐色，剥落。小枝四棱明显，微具翅。叶片椭圆形，长 4.0cm，宽 3.2cm。花萼长 0.9-1.1cm，花萼棱明显，无毛。花蕾圆锥形，缝合线中等突起。花序长 19cm，宽 17cm，每花序着花数 60-80 朵。花径 3.2-3.5cm。花复色，花瓣上部主要颜色为紫红色（Red-Purple 63B），花瓣上部次要颜色为（White NN155C），花瓣长 0.8-1.3cm，宽 0.9-1.4cm，花瓣边缘皱褶不明显，瓣爪与花瓣上部主要颜色同色，长 0.8cm。花具淡香。花期 6-8 月。果实椭圆形，长 1.0cm，宽 0.9cm，果期 8-10 月。

申请品种婉粉同近似品种 **Prairie Lace** 主要差异

	婉粉	Prairie Lace
花：上部主要颜色	Red-Purple 63B	Red-Purple 58B
花：花香	淡香	无香味

申请品种婉粉尚未公开销售。

东北齐庆

所属的种或属： 小檗属
培育人： 姜念彬 张庆军 林建福
申请人： 姜念彬 张庆军 林建福
申请号： 20150027
申请日： 2015 年 2 月 3 日

说 明：申请品种东北齐庆是 2007 年春，在东北地区的齐齐哈尔市郊区，发现 67 株（丛）叶片全红色或粉红色的紫叶小檗变异并扩繁获得。申请品种东北齐庆为丛生灌木株高均在 1.5 米左右，多分枝，枝条直立，耐修剪，可造型，幼枝干常红色，枝节有小刺，叶片约 1 至 3 厘米，叶片春夏秋冬均为艳红色，属半落叶植物。在我国北方花期五至六月份，花朵金黄色，有香味，果实极多，艳红色，有光泽，半透明，冬季不落。耐高寒，在本地区零下 40 度生存，七年内露地栽培，能正常发育生长，无冻害，灼伤。

申请品种东北齐庆与近似品种紫叶小檗比较的不同点：

	叶型	叶色	花型	花色	耐寒性	整株颜色
东北齐庆	长厚	红颜	偏圆	金黄	耐寒 40 度	四季在光照好的条件下呈全红或粉红状态，观赏性极强。
紫叶小檗	小尖	暗绿红	散圆	暗黄	耐寒 20 度	四季变化明显，颜色色差大，退化返祖现象强。

申请品种东北齐庆尚未公开销售。

橙光墨影

所属的种或属： 桂花
培育人： 傅剑波 朱锡君 刘济祥 林富平 程雪梅
申请人： 浙江滕头园林股份有限公司
申请号： 20150032
申请日： 2015 年 2 月 9 日

说 明：申请品种橙光墨影 1981 年滕头人在浙江奉化董村开始桂花苗培育，在 10 多年的培育

过程中发现在同一管理水平下，发现出生长速度适宜，长势良好，树形紧凑，分枝繁茂，树冠圆润，在开花时，该品种表现为花量大，花期较长的植株扩繁获得。申请品种橙光墨影为常绿乔木，高达7 m；树冠近球形；分枝较密，直立性强；树皮灰白色，密生深褐色圆形皮孔。单叶对生，革质，两面无毛，表面深绿色，背面前绿色。叶片长椭圆形，全缘或有稀疏锯齿；叶面凹呈V型，微皱；先端尖，基部宽楔形；花橙黄色，RHS-CC 25B~24A；花瓣椭圆形，雄蕊2。子房退化，不结实。花期：10月上中旬，持续时间较长。

申请品种橙光墨影与近似品种朱砂丹桂比较的不同点：

品种名 对比特征	橙光墨影	朱砂丹桂
分枝	较密	较少，粗壮
叶面	“V”型	宽“V”型
叶基部	宽楔形	楔形
叶长宽比	约2.3	约3.0
叶色	深绿色	绿褐色微显橙红
花色	RHS-CC 25B~24A	RHS N25A~25A

申请品种橙光墨影尚未公开销售。

金枝玉叶

所属的种或属： 朴属
 培育人： 傅剑波 朱锡君 刘济祥 林富平 程雪梅
 申请人： 浙江滕头园林股份有限公司
 申请号： 20150033
 申请日： 2015年2月9日

说 明：申请品种金枝玉叶为申请人2001年在浙江滕头园林股份有限公司宁波奉化苗圃地内，种植一批珊瑚朴实生苗发现1株叶色变异的植株扩繁选育获得。申请品种金枝玉叶，属落叶乔木，冠大荫浓，树姿雄伟，与珊瑚朴的植株形态与生物学特性相似，可以长成高大乔木，与珊瑚朴相比芽具有早熟性，萌发力和分枝力强，枝长与节间长度均小，高生长较慢，树形紧簇丰满；叶片较大，叶片较薄，其叶色呈现季节性变化，春季颜色金黄色，夏季黄绿色，秋季接近绿色，而珊瑚朴的叶色基本保持深绿色，至秋季转为绿黄色；同一枝条不同部位的叶片颜色差异性比珊瑚朴更大。

申请品种金枝玉叶与近似种珊瑚朴比较的不同点：

相似品种名称	相似品种特征	申请品种特征
珊瑚朴	幼叶：颜色 绿色	金黄色
	叶：春季颜色 绿色	金黄色
	叶：夏季颜色 绿色	黄绿色
	叶：秋季颜色 绿黄色	近绿色
	叶：质地 厚纸质	纸质

申请品种金枝玉叶尚未公开销售。