

国家林业局植物新品种保护办公室初审公告

(第 1601 号)

按照《中华人民共和国植物新品种保护条例》和《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（林业部分）》的有关规定，现将国家林业局受理并经初审合格的植物新品种权申请公开，请申请人按照有关规定于三个月内缴纳审查费。任何人均可对其中不符合条件或不实之处，向国家林业局植物新品种保护办公室提出书面异议请求，并说明理由。

特此公告。

2016 年 01 月 12 日

城院绯虹

所属的种或属： 槭属
培育人： 祝志勇，林乐静，林立
申请人： 宁波城市职业技术学院
申请号： 20150100
申请日： 2015 年 6 月 6 日

说 明：申请品种为 2011 年 5 月，在浙江省宁波市宁海县深甽镇南溪山槭树资源调查中，从鸡爪槭自然分布群落中发现一植株并选育获得。申请品种为落叶乔木，树皮灰色。当年生枝条紫红色，多年生枝条灰绿色，叶片纸质，基部心形或近于心形，掌状 5~9 裂，裂片长卵圆形，先端渐尖，边缘具有尖锐锯齿，裂片深达叶片的 1/2~3/4，嫩叶中间紫红色边缘绿色，成熟时叶片上面绿色，下面黄绿色，秋叶黄色；叶脉有白色柔毛，叶柄长 2~5cm，偶有稀疏白柔毛；花期 3~4 月，伞房花序顶生，无毛，约具 10~20 朵花，总花梗长 2~4cm；花萼片 5，紫红色；花瓣 5，淡黄色；雄蕊 8；子房被有白色柔毛。翅果朝上生长多而密，幼时深红色，成熟时棕黄色，坚果球形，幼时黄绿色，后渐渐转为深红，成熟时为棕黄色，脉纹明显，果期 9 月，两翅张开成钝角。

申请品种城院绯虹和近似种鸡爪槭比较的不同点如下：

品种名称	城院绯虹	鸡爪槭
果颜色	幼时紫红色	幼时玫红色
果着生方式	翅果朝上多而密	翅果朝下（或侧面）较疏
嫩叶	中间紫红色边缘绿色	中间绿色边缘紫红色

申请品种城院绯虹尚未公开销售。

香艳丰后

所属的种或属： 梅
培育人： 周杰 庄淑琴 徐坤 邹纹东 王政 张淑珍 庄振 庄实传
申请人： 北京林大林业科技股份有限公司 青岛颐梅风景园林有限公司

申请号：20150101
 申请日：2015 年 6 月 8 日

说 明：申请品种香艳丰后为丰后天然授粉半同胞家系实生苗中获得，母树为树龄 10 年以上、生长旺盛抗寒优良品种梅的天然授粉种子繁育的实生苗。申请品种香艳丰后的主要特征特性：树冠扁圆形，枝干红褐色，小枝灰绿色，大部被绛紫色所掩；着花及繁密，2 朵着生于各类花枝上。花期 4 月中下旬（2013 年 4 月 23 日开 85%。花径 3.3（3.2~3.5）cm）；花蕾卵圆形，无孔，深粉红色，英国皇家园艺学会比色卡 68-A。花态淡碗型；花色粉红色，英国皇家园艺学会比色卡 68-B，内瓣色花瓣外翻，其他均波状起伏，花瓣 26.9（22~31）+（0~3♂），萼片 5，绿色，大部被绛紫色所掩，盛开强烈反曲。花梗 3~4 mm。雄蕊，短于瓣，不等长，辐射至集束花心。雌蕊 1，均发达。花心正常，花甜香，结果。花期晚，花色艳，与淡丰后花期相遇，形成红、白相间的植物景观；花瓣外翻或起伏飞舞，瓣边缘均有钝锯齿。香艳丰后与母本的观赏性状的显著差异主要表现在：一是花期晚 7~8 天。二是花型较大，花径比丰后大 0.3~0.5 cm；三是花色粉红色，且较深。香艳丰后花色为英国皇家园艺学会比色卡 68-B，而丰后为 65-A。四是瓣绿，有钝锯齿，而丰后为全缘，无锯齿。五是花有甜香，丰后无香味。

申请品种香艳丰后和近似品种丰后比较的不同点如下：

性状	香艳丰后	丰后
花期	4 月中下旬	4 月上中旬
花色	粉红，英比色卡 68-B	粉红，英比色卡 65-A
花香	甜香	无
花态	浅碗型	浅碗型
花径	3.3（3.2~3.5）	2.9（2.7~3.2）
花蕾	卵形，无孔	卵形，无孔
花瓣	26.9（22~31）+（0~3♂），色不匀，有齿	19（18~22）+（0~3♂），色不匀，无齿
花萼	5，盛开强烈反曲	5，盛开强烈反曲
雄蕊	辐射，内扣于花心，短于瓣	辐射至集束花心，短于瓣
雌蕊	1，发达或不发达，短于雄蕊	0~1，发达或不发达
结实状况	未结实	少量结实

申请品种香艳丰后尚未公开销售。

寒露

所属的种或属：梅
 培育人：周杰 庄淑琴 徐坤 邹纹东 王政 庄实传 张淑珍
 申请人：北京林大林业科技股份有限公司 青岛颐梅风景园林有限公司
 申请号：20150102
 申请日：2015 年 6 月 8 日

说明：申请品种寒露为真梅系江梅的芽变获得。申请品种寒露的主要特征特性：树冠：倒卵状扁圆形。枝干：干灰紫，大枝斜出；小枝直上、斜出及横伸，中粗，淡暗绿，生长量中等。着花状况：中密，1-2朵于短、中及长花枝上；花期：3月下旬至4月中旬（青岛80%）。花径：1.9（1.8-2.3）cm，花蕾：倒卵形，顶尖或圆，中心无孔，淡乳黄；花态：碟型；花色：正反面均白色；花瓣：5，偶6；萼片：5，平展，淡绿，多为绛紫所掩；花梗：短；雄蕊：略短于花瓣，辐射；雌蕊：0-1，发达；花心：正常。其它：清香，大量结实，结实时间很晚，10月上旬的寒露节气前后成熟，较江梅的果实为小，果色至成熟均为绿色。是花果兼用梅优良品种。寒露是在10月上旬的寒露节气前后成熟，比江梅晚90天。此新品种的果实比江梅小，果色至成熟均为绿色，江梅果实至成熟为黄绿色。

申请品种寒露与近似品种江梅比较的不同点如下：

性状	江梅	寒露
花瓣数	5	5偶6
花径	2.2（2.1~2.3）	1.9（1.8~2.3）
雄蕊	辐射，略短于瓣	同江梅
雌蕊	0~1，发达	同江梅
结果（单株）量	12.7-15.3kg	13.1-15.6kg
单果重（平均）	7.3g	5.9g
果径（平均）	2.1cm	1.6cm
成熟期	7月初（3-5日）	10月上旬，寒露节气
果色	黄绿色	绿色、黄绿色

申请品种寒露尚未公开销售。

抱心淡丰

所属的种或属：梅

培育人：庄淑琴 周杰 庄实传 徐坤 邹文东 王政

申请人：青岛颐梅风景园林有限公司 北京林大林业科技股份有限公司

申请号：20150103

申请日：2015年6月8日

说明：申请品种抱心淡丰为杏梅系淡丰后的芽变获得。抱心淡丰的主要特征特性：花期：4月14日，开60%（有落花现象），开的花均有抱心现象（已连续观察三年，均有抱心现象）。树型：不规则；皮孔：中多；树干：紫褐色。枝干：红褐色；小枝：纤细，红褐色；花色：正面极浅粉红，反面淡粉红；花型：浅碗型；无香味；花梗：3-4mm；花蕾：深粉红色，卵圆形，无孔；花萼：5，绿色，近全部被绛紫色所掩；着花：较繁密，多位于束、短、中花枝1-2朵，多1朵；花径：3.0（2.8-3.2）cm；花瓣：22.4（19-25）+（0-2）♂；雄蕊：短于瓣，辐射，内扣于花心；雌蕊：发达或不发达，短于雄蕊；未见结果；花的特性：花心均呈抱心状，内瓣全部内扣，紧抱于心，一轮外瓣全部外开，盛花时，内扣瓣微开；花期与淡丰后相同。抱心淡丰花态浅碗型，花心均呈抱心状，内瓣全部内扣，紧抱于心，一轮外瓣全部外开，盛花时，内扣瓣微开。淡丰后浅碗型，外瓣略后翻，内瓣略内扣。

申请品种抱心丰后与近似品种淡丰后比较的不同点如下：

性状	淡丰后	抱心淡丰
----	-----	------

花色	正面近白色，反面极浅粉红	正面极浅粉红，反面淡粉红
花瓣数	21 (20-27) +3 变瓣	22.4 (19-25) +0-2) ♂
花径	3.2 (3.0-3.9)	3.0 (2.8-3.2)
花萼	5，盛开，强烈反曲	5，盛开，反曲
雌蕊	0-2，发达	1，发达或不发达
花态	浅碗型，外瓣略后翻，内瓣略内扣	浅碗型，花心呈抱心状，花瓣强烈内扣
结果	易结实	未见结果

申请品种抱心淡丰尚未公开销售。

晚霞宫粉

所属的种或属： 梅

培育人： 庄淑琴 周杰 庄实传 徐坤 邹文东 王政

申请人： 青岛颐梅风景园林有限公司 北京林大林业科技股份有限公司

申请号： 20150104

申请日： 2015 年 6 月 8 日

说 明：申请品种是晚霞宫粉天然授粉半同胞家系实生苗中选出。申请品种晚霞宫粉的主要特征特性：树冠卵圆形；皮孔大，较密；枝干灰褐色，小枝灰绿色；着花较繁密，1~2 朵着生于各类花枝上。花期 4 月中旬（2013 年 4 月 18 日开 75%）。花径 2.95 (2.8~3.) cm；花蕾扁圆至近圆形，无孔，粉红色，英国皇家园艺学会比色卡 62-B。花态碟形；花色较深粉红，英国皇家园艺学会比色卡 62-C。花瓣 23 (20~26) + (1~3 ♂)，萼片 5，绿色，大部被绛紫色所掩。花梗 3~4 mm。雄蕊，短于瓣，辐射至内抱。雌蕊，多无，偶 1，发达或不发达，与雄蕊等长。花有清香味，偶结果，量极少。该品种的特点，一是花期晚，是青岛宫粉品种群花期最晚的品种；而是花色艳丽，花型较大，花瓣三轮，除外层瓣，均呈波状起伏飞舞或内扣状。晚霞宫粉与母本粉皮宫粉的显著差异，一是花期晚，比母本晚 7~10 d。其花期与淡丰后花期相遇，属青岛花期最晚的宫粉品种；二是花型较大。平均为 2.95 cm，而母本平均 2.55 cm；三是花瓣 3 层，内两层呈飞舞或内扣状，甚美，而母本仅内 1 层呈飞舞状；四是雌蕊数不同，结实甚少。晚霞宫粉多无雌蕊，偶 1，而母本 1~3 个雌蕊，个别为 4（详见表）。

申请品种晚霞宫粉与近似品种粉皮宫粉比较的不同点如下：

性状	晚霞宫粉	粉皮宫粉
花期	4 月上、中旬	4 月上旬
花色	粉红色，英比色卡 62-B	粉红色，英比色卡 62-A
花香	清香	浓香
花径	2.95 (2.8~3.0) cm	2.55 (2.3~3.0) cm
花瓣	23 (20~26) + (1~3 ♂)，二层飞舞	23 (16~28) + (0~3 ♂)，内 1 层起伏
花蕾	近圆球，无孔	扁圆至圆球，无孔
花萼	5，偶 6	5
花态	碟形	碟形
雄蕊	辐射至内抱，短于瓣	多四射，与瓣等长或略长
雌蕊	多无，偶 1，发达或不发达	1-3，个别 4，发达或退化

结实状况	偶结实，甚少	结实
------	--------	----

申请品种晚霞宫粉尚未公开销售。

映秋青

所属的种或属：梅

培育人：庄淑琴、周杰、王政、庄振、徐坤、邹文东、张淑珍、庄实传

申请人：青岛颐梅风景园林有限公司

申请号：20150105

申请日：2015年6月8日

说明：申请品种映秋青为真梅系江梅的芽变获得。申请品种映秋青的主要特征特性：该品种属于梅花品种的单瓣品种群。其树冠：倒卵状扁圆形。枝干：干灰紫，大枝斜出；小枝直上、斜出及横伸，中粗，淡暗绿，生长量中等。着花状况：中密，1-2朵于短、中及长花枝上；花期：花期3月下旬至4月中旬。2015年3月30日开80%（青岛）。花径：2.0（1.9-2.3）cm；花蕾：倒卵形，顶尖或圆，中心无孔，淡乳黄；花态：碟型；花色：正反面均白色；花瓣：5偶6；萼片：5，平展，淡绿，多为绛紫所掩；花梗：短；雄蕊：略短于花瓣，四射；雌蕊：0-1，发达；花心：正常。其它：清香。结果（单株）量14.8-16.2kg。单果重（平均）6.7g。果径（平均）1.7cm。成熟期8月中旬（青岛）。映秋青为花果兼用梅，每年结果，果色绿色、黄绿色。抗寒性强，能安全越冬越夏。映秋青与江梅的主要差异是该品种果实成熟期极晚，比江梅晚40天，属晚成熟期品种。且新品种的果实比江梅小，果色至成熟均为绿色，江梅果实至成熟为黄绿色。

申请品种映秋青与近似种江梅比较的不同点如下：

性状	江梅	映秋青
花瓣数	5	5偶6
花径	2.2（2.1~2.3）	2.0（1.9~2.3）
结果（单株）量	12.7-15.3kg	14.8-16.2kg
单果重（平均）	7.3g	6.7g
果径（平均）	2.1cm	1.7cm
成熟期	7月初（3-5日）	8月中旬
果色	黄绿色	绿色、黄绿色

申请品种映秋青尚未公开销售。

杨叶榉

所属的种或属：榉属

培育人：金晓玲，胡希军，邢文，方向东，汪晓丽，张亚平

申请人：中南林业科技大学

申请号：20150106

申请日：2015年6月15日

说明：申请品种杨叶榉于2011年9月在常德榉树良种繁殖基地发现的，是从大叶榉（*Zelkova schneideriana*）种子繁殖的实生苗的变异中选育获得。落叶乔木，与常规大叶榉相比具有树冠扁球形，分枝长、叶片大，叶间距大、叶片形状宽椭圆至宽卵形、枝条平展等形态特点。

申请品种杨叶榉与近似种普通大叶榉比较的不同点如下：

性状	普通大叶榉	杨叶榉
分枝长度 (cm)	10-50cm	60-120cm
冠形	窄卵球至卵球	扁球
枝伸展方向	斜上伸展	平展
叶片形状	椭圆-卵圆形	宽椭圆-宽卵形
叶间距	1.43-2.43	3.83-3.87
叶长	7.0-7.7	9.8-12.3
叶宽	3.4-4.3	5.1-5.6

申请品种杨叶榉尚未公开销售。

碧翠

所属的种或属： 木兰属

培育人： 金晓玲，胡希军，耿芳，邢文，蔡梦颖，张冬林

申请人： 中南林业科技大学

申请号： 20150107

申请日： 2015 年 6 月 15 日

说 明：申请品种碧翠是 2006 年 12 月下旬在长沙天际岭林场发现一株胸径约 28cm 的广玉兰的变异后扩繁获得。申请品种为常绿乔木，树冠半球形；小枝向上斜展，呈浅绿色，光滑无毛，老枝灰黑色；叶倒卵形，上下表面均光滑无毛；成熟叶片翠绿色，新叶浅亮绿色；叶柄短，叶柄基部稀被黑褐色绒毛。

申请品种碧翠与近似品种 Green Giant 比较的不同点如下：

品种		Green Giant	碧翠
枝条		当年生枝条绿色，光滑无毛，老枝红褐色	当年生枝条绿色，光滑无毛，老枝灰黑色
叶	叶形	长椭圆形	倒卵形
	叶色	顶部叶片亮绿色，底部叶片浅绿色	翠绿色
	表面毛	几无毛或具少量锈色绒毛	上下表面均光滑无毛
	叶长 (cm)	18-23	22-28
	叶宽 (cm)	8-11.5	12-16
	叶柄 (cm)	1.27-2.54	1.4-2.0

申请品种碧翠尚未公开销售。

盐柳 1 号

所属的种或属： 柳属

培育人： 李献礼、吕文泉

申请人： 山东三益园林绿化有限公司

申请号： 20150108

申请日： 2015 年 6 月 15 日

说 明：申请品种盐柳 1 号 2009 年，在潍坊滨海地区进行野外种质资源调查、汇集，引种 150 株优良单株，遂对其进行无性繁殖建立无性系，利用 150 个无性系潍坊沿海多地营造无性系测定林，筛选出 7 个优良无性系，经过对无性系的抗盐性、耐涝、耐干旱、生长量进行测定，发现其中一沙柳变异与其他相比有性状差异，后扩繁获得。申请品种为落叶乔木，主

干明显，顶端优势强；小枝幼时具绒毛，后渐变光滑，叶条形或条状倒披针形，生物量大；枝条呈现微红色；春季开花，花期 4-5 月，花序与叶同时开放，果期 5 月。

申请品种盐柳 1 号与近似种沙柳比较的不同点如下：

相似种名称	相似品种特征	申请品种特征
沙柳	灌木或小乔木	乔木
	枝条呈黄色	枝条呈微红色

申请品种盐柳 1 号尚未公开销售。

盐松 3 号

所属的种或属：桤柳属

培育人：李献礼、吕文泉

申请人：山东三益园林绿化有限公司

申请号：20150109

申请日：2015 年 6 月 15 日

说 明：申请品种盐松 3 号 2006 年，在东营、潍坊、滨州环渤海、黄海及西部、西北部等地区进行野外种质资源调查、汇集，初步选出 126 株优良单株，遂对其进行无性繁殖建立无性系，利用 126 个无性系在潍坊滨海等地营造无性系测定林，筛选出 9 个优良无性系，经过对无性系的抗盐性、耐涝、耐干旱、生长量进行测定，发现其中一发现自潍坊昌邑的中国桤柳变异与其他相比有性状差异。申请品种落叶乔木，主干明显，顶端优势强；老枝直立，暗褐色，当年生枝绿色，有光泽；嫩枝繁密纤细，下垂，生物量大；春夏叶色翠绿（淡蓝绿色），秋季树冠外围叶片蓝紫色至紫红色；每年夏秋季开花，稀见，总状花序侧生去年生木质化的小枝上，花量少，花 5 数，萼片 5，花瓣 5，白至淡粉色；种子败育。

申请品种盐松 3 号与近似种中国桤柳比较的不同点如下：

相似品种名称	相似品种特征	申请品种特征
中国桤柳	灌木或小乔木	乔木
	秋季叶色绿色至黄色	秋季树冠外围叶片蓝紫色至紫红色
	秋冬落叶	部分叶片至冬不落

申请品种盐松 3 号尚未公开销售。

晋翅 1 号

所属的种或属：胡颓子属

培育人：张华新、刘正祥、赵罕、张连水、马克昌、张廷义

申请人：中国林业科学研究院

申请号：20150110

申请日：2015 年 6 月 18 日

说 明：申请品种晋翅 1 号是 2003 年 8 月 ~ 2004 年 11 月，在乡宁、翼城、平陆等集中分布区连续 2 年的调查中发现，翅果油的果实变异明显、单株之间差异较大，2006 年 ~ 2014 年，采用优质无性系幼苗造林，开展生物学特性以及果实的特异性、稳定性等方面的遗传测定与评价工作，选出获得。申请品种落叶乔木；树皮深灰色，深纵裂；嫩枝灰绿色，密被银

灰色星状绒毛和鳞片；叶互生，卵形或卵状椭圆形，长6~9 cm，宽2~5 cm，全缘，下面密被灰白色星状绒毛；花两性，淡黄绿色，单生或3~7朵簇生于幼枝叶腋；新梢生长始于3月下旬，4月上旬花芽开始膨大，4月下旬为展叶盛期和初花期，5月上旬盛花期，5月中旬终花期。果实形成始于5月下旬，6月下旬进入幼果迅速膨大期，7~8月为果实积累营养物质的高峰期，8月下旬至9月上旬果实基本成熟；较喜温，抗寒，抗风，耐干旱和贫瘠土壤，适宜在干旱地区生长，不耐水湿。根系发达，有根瘤，萌蘖力强。

申请品种晋翅1号与近似种翅果油树比较的不同点如下：

品种	果形	果长/mm	果宽/mm	果长/果宽	种长/mm	种宽/mm	种长/种宽
晋翅1号	扁圆形	16.61±1.0	18.53±1.2	0.90±0.07	13.85±0.9	10.84±0.9	1.29±0.15
翅果油树	近圆形	18.34±2.1	19.81±2.1	0.93±0.09	15.22±1.8	11.30±1.12	1.38±0.21
品种	单果质量/g	种子质量/g	种仁质量/g	果实出种率/%	种子出仁率		
晋翅1号	0.65±0.11	0.53±0.10	0.19±0.04	79.3±5.5	36.7±6.9		
翅果油树	0.76±0.16	0.60±0.13	0.21±0.05	78.2±5.3	33.7±6.6		

申请品种晋翅1号尚未公开销售。

晋翅2号

所属的种或属： 胡颓子属

培育人： 张华新、刘正祥、赵罕、张连水、马克昌、张廷义

申请人： 中国林业科学研究院

申请号： 20150111

申请日： 2015年6月18日

说明：申请品种晋翅2号是2003年8月~2004年11月，在乡宁、翼城、平陆等集中分布区连续2年的调查中发现，翅果油的果实变异明显、单株之间差异较大，2006年~2014年，采用优质无性系幼苗造林，开展生物学特性以及果实的特异性、稳定性等方面的遗传测定与评价工作，选出获得。申请品种落叶乔木；树皮深灰色，深纵裂；嫩枝灰绿色，密被银灰色星状绒毛和鳞片；叶互生，卵形或卵状椭圆形，长6~9 cm，宽2~5 cm，全缘，下面密被灰白色星状绒毛；花两性，淡黄绿色，单生或3~7朵簇生于幼枝叶腋；新梢生长始于3月下旬，4月上旬花芽开始膨大，4月下旬为展叶盛期和初花期，5月上旬盛花期，5月中旬终花期。果实形成始于5月下旬，6月下旬进入幼果迅速膨大期，7~8月为果实积累营养物质的高峰期，8月下旬至9月上旬果实基本成熟；较喜温，抗寒，抗风，耐干旱和贫瘠土壤，适宜在干旱地区生长，不耐水湿。根系发达，有根瘤，萌蘖力强。

申请品种晋翅2号与近似种翅果油树比较的不同点如下：

品种	果形	果长/mm	果宽/mm	果长/果宽	种长/mm	种宽/mm	种长/种宽
晋翅2	扁圆	19.54±0.86	21.36±1.20	0.92±0.05	15.66±1.00	11.91±0.80	1.32±0.12
翅果	近圆	18.34±2.19	19.81±2.14	0.93±0.09	15.22±1.84	11.30±1.12	1.38±0.21
品种	单果质量/g	种子质量/g	种仁质量/g	果实出种率/%	种子出仁率/%		
晋翅2	0.85±0.13	0.66±0.11	0.22±0.06	75.8±4.5	32.6±6.4		
翅果	0.76±0.16	0.60±0.13	0.21±0.05	78.2±5.3	33.7±6.6		

申请品种晋翅2号尚未公开销售。

晋翅 3 号

所属的种或属： 胡颓子属

培育人： 张华新、刘正祥、赵罕、张连水、马克昌、张廷义

申请人： 中国林业科学研究院

申请号： 20150112

申请日： 2015 年 6 月 18 日

说 明：申请品种晋翅 3 号是 2003 年 8 月 ~ 2004 年 11 月，在乡宁、翼城、平陆等集中分布区连续 2 年的调查中发现，翅果油的果实变异明显、单株之间差异较大，2006 年 ~ 2014 年，采用优质无性系幼苗造林，开展生物学特性以及果实的特异性、稳定性等方面的遗传测定与评价工作，选出获得。落叶乔木；树皮深灰色，深纵裂；嫩枝灰绿色，密被银灰色星状绒毛和鳞片；叶互生，卵形或卵状椭圆形，长 6~9 cm，宽 2~5 cm，全缘，下面密被灰白色星状绒毛；花两性，淡黄绿色，单生或 3~7 朵簇生于幼枝叶腋；新梢生长始于 3 月下旬，4 月上旬花芽开始膨大，4 月下旬为展叶盛期和初花期，5 月上旬盛花期，5 月中旬终花期。果实形成始于 5 月下旬，6 月下旬进入幼果迅速膨大期，7~8 月为果实积累营养物质的高峰期，8 月下旬至 9 月上旬果实基本成熟；较喜温，抗寒，抗风，耐干旱和贫瘠土壤，适宜在干旱地区生长，不耐水湿。根系发达，有根瘤，萌蘖力强。

申请品种晋翅 3 号与近似种翅果油树比较的不同点如下：

品种	果形	果长/mm	果宽/mm	果长/果宽	种长/mm	种宽/mm	种长/种宽	
晋翅 3	椭圆	20.77±1.27	20.12±1.53	1.04±0.07	18.21±0.91	11.33±0.88	1.62±0.15	
翅果	近圆	18.34±2.19	19.81±2.14	0.93±0.09	15.22±1.84	11.30±1.12	1.38±0.21	
品种	单果质量/g		种子质量/g		种仁质量/g		果实出种率/%	种子出仁率/%
晋翅 3	0.87±0.16		0.70±0.13		0.23±0.04		80.0±4.5	33.0±4.3
翅果	0.76±0.16		0.60±0.13		0.21±0.05		78.2±5.3	33.7±6.6

申请品种晋翅 3 号尚未公开销售。

美黛

所属的种或属： 胡颓子属

培育人： 张华新 杨秀艳 刘正祥 武海雯 倪建伟 朱建峰

申请人： 中国林业科学研究院

申请号： 20150113

申请日： 2015 年 6 月 18 日

说 明：申请品种美黛是 2010 年在西北各地收集沙枣资源过程中，发现栽植于青海省农林科学院院内的两株美国沙枣母树树干通直，树型椭圆型，冠型圆形，由此母树上采收种子于 2011 年播种繁育的实生苗中选育获得。申请品种为美黛落叶乔木。生长快，具枝刺，枝刺上生有小叶 3-4 枚。三年生树干红褐色，幼枝灰白色，密被银白色鳞片。叶长圆状披针形或条状披针形，长 4.5-7 厘米，平均 5.7 厘米；宽 2-4 厘米，平均 2.4 厘米，先端钝尖或钝，基部楔形，下面密被白色鳞片，侧脉不甚明显；叶柄长 0.5-1 厘米。耐盐碱、干旱、瘠薄性强，可在含盐 6% 的滨海盐碱地上正常生长。在天津大港地区物候期（2014 年）：芽膨大期 3 月上旬，萌芽期 3 月中旬，展叶期 3 月下旬至 4 月上旬。

申请品种美黛与近似种阿拉尔种源比较的不同点如下：

品种	3 年生主干	枝刺	叶片
美黛	较通直，顶端优势较明显	较少	较大，平均长 5.7 厘米，宽 2.4 厘米；叶色深绿色

阿拉尔种源	弯曲，顶端优势弱	较多	较小，平均长 3.8 厘米，宽 1.8 厘米；叶色较浅
-------	----------	----	-----------------------------

申请品种美黛尚未公开销售。

甘州娇灿

所属的种或属： 白刺属

培育人： 张华新 杨秀艳 成铁龙 刘正祥 史胜青 张景波 朱建峰 倪建伟

申请人： 中国林业科学研究院

申请号： 20150114

申请日： 2015 年 6 月 18 日

说 明：申请品种 2011 年在甘肃地区收集白刺种质资源过程中发现一种果实亮黄色，株型与唐古特白刺有明显不同的野生白刺，2011-2012 年连续两年对此类型白刺进行观察，发现其性状稳定，且与红果类型唐古特具有明显不同，并采集种子与枝条进行播种与扦插育苗获得。申请品种落叶耐盐碱灌木。小枝白色，先端针刺状。叶常 2-3 簇生，宽倒披针形或匙形，长 1.6-2.3 厘米，宽 6-8 毫米，先端圆钝。花白色，雄蕊花丝短于柱头，花药少，雌蕊柱头较高；果实亮黄色，果汁黄色；核果，窄卵形，先端尖，内果皮具蜂窝状凹陷。花期 5-6 月；果 8 月上旬成熟。耐盐碱、干旱、瘠薄性强，可在含盐 10% 的滨海盐碱地上正常生长。在张掖地区物候期（2012 年）：芽膨大期 3 月上旬，萌芽期 3 月中旬，展叶期 3 月下旬至 4 月上旬。花期始于 5 月底（28 日），果实成熟于 8 月上旬。10 月中旬进入落叶期，10 月底完全落叶。

申请品种甘州娇灿与近似种唐古特白刺比较的不同点如下：

品种	花期	果实	种子
甘州娇灿	5 月底，较原变种晚 1 周左右	成熟时为黄色，少有橙色	小，窄卵形或近圆形，长 2-4 毫米
唐古特白刺	5 月中下旬	成熟时为红色或暗红色	较大，窄卵形，长 4-5 毫米

申请品种甘州娇灿尚未公开销售。

云鲜 1 号

所属的种或属： 箭竹属

培育人： 王曙光， 普晓兰， 丁雨龙

申请人： 西南林业大学

申请号： 20150115

申请日： 2015 年 6 月 18 日

说 明：申请品种云鲜 1 号以大理鸡足山母竹为亲本，经过 2007 年 10 月至 2008 年 5 月，从宾川鸡足山连续移栽至昆明市晋宁县城郊进行引种栽培及埋秆等方法培育而获得的。申请品种云鲜 1 号秆高达 15m，新竹胸径达 5.28cm，分枝 5-20，没有明显主枝。箨环隆起，秆环平坦或微隆起，箨鞘宿存，无箨耳与繸毛。小枝具 4-6 叶，叶片细长，无叶耳、繸毛。

申请品种云鲜 1 号与近似种云南箭竹比较的不同点如下：

	品种名	鲜笋箨鞘	新秆箨鞘
申请品种	云鲜 1 号	鲜黄色具淡紫条纹	鲜黄色具淡紫条纹
近似种	云南箭竹	紫色具深紫条纹	淡紫色具深紫条纹

申请品种云鲜 1 号尚未公开销售。

徽雅一号

所属的种或属：冬青属

培育人：詹以成、许献文、詹大勤、詹小勤、许莉丽、詹成民、徐年顺

申请人：黄山市徽雅园艺有限公司 许献文

申请号：20150116

申请日：2015 年 6 月 19 日

说明：申请品种徽雅一号是于 1998 年在本县牌楼村山场发现的冬青属树种自然状态下同属树种间杂交繁殖的新品种。申请品种徽雅一号为常绿灌木，树皮灰褐色、光滑，树枝紧密，叶厚革质、圆形，呈龟甲状、无刺、花金黄色、芳香味浓，花期 3-4 月，果期 4 月-翌年 3 月，10 月成熟果皮红色，粒大，根系发达，耐碱、耐高温、抗病抗寒能力强。

申请品种徽雅一号与近似品种比较的不同点如下：

性状	徽雅一号	猫儿刺	浙江圆叶枸骨冬青
叶形	圆形，主侧脉下陷，叶面凸起，全缘，呈龟甲状	矩形，顶端具 1 大坚硬刺齿，两侧各具 1~2 刺齿	椭圆形，叶面平展，叶端有一小刺
叶质地	厚革质，坚硬，叶面深绿色，叶背绿色	厚革质，坚硬，叶面深绿色，叶背淡绿色	薄革质，叶面绿色，叶背淡绿色
叶面大小	长3.8-4.8cm，宽3.8-4.6cm 叶基圆形	长6.2-7.2cm，宽3.5-4.1cm 叶基楔形	长3.2-4.1cm宽2.8-3.6cm 叶基近圆形
嫩枝生长	早春绿色，夏秋紫罗兰色	春夏秋均嫩绿色	春夏秋均嫩绿色
花期	3 月下旬~4 月中下旬	4 月上旬~中旬	4 月上旬~中旬
花色	白色转金黄色有芳香	白色	白色
果实大小	φ 0.51-0.72cm	φ 0.41-0.53cm	φ 0.38-0.55cm
观赏性	观叶、观花、观果效果佳	观果效果一般	观果效果佳

申请品种徽雅一号尚未公开销售。

黔中樱草黄

所属的种或属：黄杨属

培育人：陈通旋 屈志勇

申请人：陈通旋 屈志勇

申请号：20150117

申请日：2015 年 6 月 23 日

说明：申请品种黔中樱草黄 1995 年培育人从贵州省金沙县林业局苗圃场调进约 1000 株黄杨苗，用于单位绿化，其中一株有一年生枝叶黄化现象，连续观察 12 年选育获得。申请品种黔中樱草黄茎枝四楞，光滑，密集，小枝节间长 3~5mm。叶小，对生，革质，椭圆形或倒卵形，长 1~2cm，先端圆钝，有时微凹，基部楔形，最宽处在中部或中部以上，有短柄，一年生叶为樱草黄色，二年生叶表面暗绿色，背面黄绿，表面有柔毛，背面无毛，二面均光亮。一年生枝条为樱草黄色，二年生枝条与黄杨相同；花多在枝顶簇生；雄花具与萼片等长的退化雄蕊，花淡黄绿色，没有花瓣，有香气。

申请品种黔中樱草黄与近似种黄杨相比存在以下显著差异：

	一年生叶	一年生枝条
--	------	-------

黔中樱草黄	樱草黄色	樱草黄色
黄杨	绿色	绿色

申请品种黔中樱草黄尚未公开销售。

华安天香

所属的种或属： 桂花

培育人： 鲍维 鲍志坚 鲍健 马燕 臧德奎

申请人： 金华市奔月桂花专业合作社 山东农业大学

申请号： 20150118

申请日： 2015 年 7 月 6 日

说明：申请品种华安天香是 2008 申请人在一批天香台阁扦插苗中发现了一个花色为橙黄色至橙红色的芽变株系，并扩繁获得。申请品种华安天香灌木或小乔木，高达 5m，树冠椭圆形。春叶宽椭圆或近圆形，长 7~8cm，宽 4~5.5cm，先端突尖，全缘。秋叶卵形或卵状椭圆形，长 7~12cm，宽 3~4.5cm；，有细锯齿；侧脉 6~8 对。花芽 2~3 对；花序总梗长 0.5~5cm；花梗长 1~1.5(4)cm。花冠阔钟形，径 1~3cm，橙黄色或橙红色(RHS-CC 21A-B)；裂片 4，稀 3 或 5，常内扣，肉质肥厚，卵圆形，长 4~9mm，宽 3.5~8mm。盛花期秋季 9~11 月和春季 3~5 月，冬季室内可开花，夏季有少量花开。花香浓郁。

申请品种华安天香与近似品种天香台阁比较的不同点如下：

品种	花色 (RHS CC)	树冠
华安天香	橙黄或橙红色 (RHS CC 21A-B)	椭圆形
天香台阁	乳白色 (RHS 1B~2B)，秋冬季可略带乳黄色 (RHS CC 4B~6B)	柱状

申请品种华安天香尚未公开销售。

胭脂红

所属的种或属： 桂花

培育人： 鲍维 鲍志坚 鲍健 马燕 臧德奎

申请人： 金华市奔月桂花专业合作社 山东农业大学

申请号： 20150119

申请日： 2015 年 7 月 6 日

说明：申请品种胭脂红为 1982 年，浙江金华华安桂花研究所通过播种育出了一批桂花实生苗。该批实生苗于 2002 年秋季开始开花，在该批苗木中发现了一个花色呈胭脂红色的株系，2009 年开始进行扦插和嫁接繁殖获得。申请品种胭脂红是小乔木。叶长椭圆状披针形，长 11~13 cm，宽 4~5 cm；基部近圆形或宽楔形；先端渐尖；叶缘中部以上有稀疏锯齿；侧脉 10~13 对。每节叠生花芽 2~3 对，花序有花 5~8 朵；花梗长 10~15 mm。花初开时乳黄色，旋即变为胭脂红色 (RHS- CC 74A-B)。花冠近平展，径约 10 mm；花冠筒长 3~4mm，裂片椭圆形或倒卵状椭圆形，长 4 mm，宽 2 mm；子房发育。花期秋季 9 下旬至 10 上旬。

申请品种胭脂红与近似品种朱砂丹桂比较的不同点如下：

品种	花色 (RHS CC)	花梗长 (mm)	雌蕊
----	-------------	----------	----

胭脂红	胭脂红色, RHS- CC 74A-B	10~15	发育, 结实
朱砂丹桂	橙红色, RHS- CC N25A~25A	6~7 (9)	败育, 不结实

申请品种胭脂红尚未公开销售。

早馨

所属的种或属: 桂花

培育人: 臧德奎 马燕 鲍志贤 鲍健 鲍维

申请人: 山东农业大学 金华市奔月桂花专业合作社

申请号: 20150120

申请日: 2015 年 7 月 6 日

说明: 申请品种早馨是 2002-2003 年进行桂花品种调查时, 在金华安地镇华安桂花基地的实生苗选育得到。申请品种早馨为常绿小乔木, 主干通直, 树冠近球形。叶厚而宽大, 长椭圆形, 长 9-11 cm, 宽 4-5cm, 长宽比约 2.2, 表面深绿色, 叶面微凹呈宽“V”形; 全缘; 侧脉 12-16 对。叶柄长 13-16mm。幼叶黄绿色。叠生花芽 3-4 对, 着花繁密。花梗长 6~7mm。花初开时乳黄色, 盛开时黄白色 (RHS CC 4D)。花冠斜展, 径 7~8mm, 花冠裂片倒卵形, 肥厚。花期早, 8 月中下旬至 9 月上旬盛花。

申请品种早馨与近似品种阔叶早银桂比较的不同点如下:

品种	叶	花芽	花梗长 (mm)	花径 (mm)	花色 (RHS CC)	花期 (金华)
早馨	多长椭圆形; 侧脉 12-16 对; 叶柄长 13-16mm	紫红色; 3-4 对	6-7	7-8	乳黄色至黄 白色 (4D)	8 月中下旬 至 9 月上旬
阔叶早银桂	多卵状椭圆形; 侧脉 7-10 对; 叶柄长 9-11mm	绿色; 2-3 对	7-9	5-7	白色或浅黄 白色 (1D-2D)	9 月上旬

申请品种早馨尚未公开销售。

春香

所属的种或属: 连翘属

培育人: 潘会堂 张启翔 申建双 石超 叶远俊 胡杏 程堂仁 王佳 丁晓六

申请人: 北京林业大学

申请号: 20150121

申请日: 2015 年 7 月 1 日

说明: 申请品种春香是申请人 2011 年 4 月在国家花卉工程技术研究中心种质资源与育种基地以连翘做母本, 朝鲜白连翘做父本进行人工杂交后选育获得。申请品种春香基本特征: 直立灌木, 株高 1.3-1.5 m, 3 年生植株冠幅 1.5-1.6 m。长势中等, 枝干紧密, 当年生枝髓心中空, 老枝髓心具膜; 当年生枝绿色, 皮孔少; 具单叶和三小叶复叶; 叶片卵圆形, 叶片质地纸质; 叶片春季绿色, 夏季深绿色, 秋季紫绿色; 叶面及叶背无毛; 叶基圆形, 当年生枝上叶片具粗锯齿, 老枝上叶片具细锯齿; 花单生、长花柱, 花的着生密度中等, 花冠口直径为 3cm 左右, 花瓣浅黄色, 花裂片窄椭圆, 花冠筒心脉黄色, 雌雄蕊长度比长; 花萼上端为红褐色、宿存, 萼片与花冠筒长度比 2/3; 有果喙; 抗寒性强。连续观察 2 年, 性状稳定。

申请品种春香与近似品种金钟连翘‘Courtaneur’比较的不同点如下：

品种名	春香	Courtaneur
枝条：节间	长	短
花：花香	有香味	无香味
叶：形状	卵圆形	披针形

申请品种春香尚未公开销售。

蝶恋

所属的种或属： 杜鹃花属
 培育人： 苏家乐 何丽斯 刘晓青 李畅 肖振
 申请人： 江苏省农业科学院
 申请号： 20150122
 申请日： 2015 年 7 月 6 日

说 明：申请品种蝶恋为 2005 年 4 月，以江、浙、沪等地传统绿化用毛鹃品种紫蝴蝶为母本，丹东地方性东鹃单套品种红珍珠为父本配置杂交组合后选育获得。申请品种蝶恋枝条开张度中等，一年生枝条浅绿色，2 年生枝条褐色。叶常二型（春生叶大，夏生叶小），幼叶淡绿色，老叶深绿色，绒毛或糙伏毛较多；新叶披针形宽 1.5 ～2.0cm，长 3.5～5.0cm；老叶倒披针形，宽 1.2 ～1.6cm，长 3.1～4.2 cm；叶正面有对称性规则网纹，叶脉洼陷明显。花 2～3 朵合生于枝顶，花色为艳丽欲滴的玫紫色，萼片绿色 5 裂，花型为单套型；雄蕊 5～7 枚，不等长；花冠漏斗形，5 裂，中间上部裂片有少量深色斑点，花径 3.5～4.5cm。

申请品种蝶恋与近似品种红珍珠比较的不同点如下：

主要特性	蝶恋	红珍珠
花色	玫紫	深玫红
花径	3.5～4.5cm。	2.5～3.5cm。
新生枝条颜色	绿色	暗红色
长势	强	中
叶型	倒批针形	椭圆形

申请品种蝶恋尚未公开销售。

胭脂蜜

所属的种或属： 杜鹃花属
 培育人： 刘晓青 李畅 苏家乐 何丽斯 李畅 肖振
 申请人： 江苏省农业科学院
 申请号： 20150123
 申请日： 2015 年 7 月 6 日

说 明：申请品种胭脂蜜是 2005 年 4 月，申请人在白色撒玫红条纹花的东鹃品种大鸳鸯锦上发现玫红色花朵芽变，并扩繁获得。申请品种胭脂蜜枝条开张度中等偏小，一年生枝条浅绿色，2 年生枝条褐色。叶常二型（春生叶大，夏生叶小），幼叶淡绿色，老叶深绿色，绒毛或糙伏毛较多；新叶浅绿色，宽 1.8 ～2.5cm，长 2.8～6.1cm；老叶椭圆形，宽 1.1 ～1.5cm，长 2.1～3.5 cm，；叶正面有对称性规则网纹，叶脉洼陷不明显，叶面和叶缘绒毛较多，叶面无光泽感。花 2～3 朵聚合生于枝顶，花色为艳丽欲滴的玫红色，萼片瓣化为花瓣，花型为夹套型；雄蕊 5～7 枚，不等长；花冠漏斗形，5 裂，裂深 1.5～2.5cm，中间上部裂片有少

量深色斑点，花径 5.5~6.5 cm。果期 11~12 月，蒴果卵圆形。

申请品种胭脂蜜与近似品种大鸳鸯锦比较的不同点如下：

主要特性	胭脂蜜	大鸳鸯锦
花色	白色撒玫红条纹	纯玫红色

申请品种胭脂蜜尚未公开销售。

幻彩

所属的种或属： 锦带花属

培育人： 唐宇丹、安玉来、白红彤、李霞、李慧、尤洪伟、石雷、惠学娟、法丹丹

申请人： 中国科学院植物研究所 青岛中科景观植物产业化发展有限公司

申请号： 20150124

申请日： 2015 年 7 月 7 日

说 明：申请品种幻彩国外引进品种金花叶锦带的芽变枝条选育的新品种。申请品种少女花语落叶灌木，生长势强，枝条直立生长；当年生枝具四棱，表面背毛、绿色具红晕或棕红色；花枝上和营养枝上叶片差异较大，花枝上叶片卵圆形，平均叶长 $5.79 \pm 1.17\text{cm}$ (4~8cm)、宽 $3.9 \pm 0.64\text{cm}$ (4~6cm) cm，营养枝上叶片宽卵圆形，长 $8.75 \pm 0.56\text{cm}$ (4~8cm)、宽 $5.08 \pm 0.44\text{cm}$ (3~5cm)，顶端渐尖、基部宽楔形或近圆形，叶缘细锯齿，较平滑、无或几无波状，叶片表面泡状起伏较轻，叶背密生短柔毛；叶片复色，叶缘具黄色至浅黄色边，叶片主色深绿；花序着生于 2 年生枝或当年生短枝的叶腋或枝顶，顶生花序为圆锥花序，每花序具 3~8 朵（常 4-5 朵），花冠两色，初时白色或浅粉色、后变为粉色，花冠裂片颜色 RHS 比色卡 65D~69D，花冠口直径约 $3.12 \pm 0.26\text{cm}$ ，花冠筒钟状，花萼片密被绒毛，萼片狭披针形、浅绿色、具白边，花冠裂片顶端圆形，柱头伸出花冠外，花期 5 月中下旬，持续时间约 15~20 天，秋季具有二次花。

申请品种幻彩与近似品种金花叶比较的不同点如下：

性状特征	相似品种	申请品种
	金花叶	幻彩
植株：生长势	强	很强
植株：生长习性	半直立	直立
叶片：形状	卵圆形	卵圆形-宽卵圆形
叶片：大小	中	较大
叶片：宽度	中	宽
叶片：叶缘波状	弱	无或极弱
叶片：幼叶颜色	绿	墨绿
叶片：复色程度	中	弱
叶片：叶面泡状	强	弱

申请品种幻彩尚未公开销售。

春黄

所属的种或属：丁香属

培育人：李长海 郁永英 翟晓欧 宋莹莹 范淼

申请人：黑龙江省森林植物园

申请号：20150125

申请日：2015年7月7日

说明：申请品种春黄是培育人从白丁香（*Syringa oblata* var. *alba*）扦插苗中选育而出，扩繁获得。申请品种落叶灌木，高可达3~4m，树皮暗褐灰色，有浅沟裂；幼枝浅绿或金黄色，无毛，2年生枝黄褐色或灰褐色，有散生皮孔；冬芽球形，黄绿色，芽鳞多数，无毛；单叶对生、较小，全缘，纸质，宽卵圆形至肾形，长2~8cm，宽1.5~6.5cm，先端短渐尖，基部心形，萌生枝叶片较大，长圆状卵形，先端渐尖，基部圆截形至扩楔形，背面微有柔毛（非光滑无毛），但花枝之叶常无毛；叶柄长0.8~2.5cm，无毛；圆锥花序自侧芽生出，顶芽缺，长可达19cm，宽可达8cm，无毛，花大，花蕾黄色或浅黄色，花白色，花萼4浅裂，长约1.5mm，裂片三角形，无毛；花冠4裂，长15~18mm，直径10~12mm，裂片大、椭圆形至长圆形，外展，花冠筒细长呈管状；雄蕊2，着生于花冠筒的中上部；子房卵球形，花柱细长，达花冠筒的中下部；花柄长2~5mm，无毛；蒴果长圆形，长1~1.5cm，粗约7mm，先端渐尖，呈长嘴状，光滑，无疣状凸起；花期5月中下旬；果熟期9月中下旬。

申请品种春黄与近似种白丁香比较的不同点如下：

品种/种	叶色	叶片质地	叶变色期	叶片大小	幼枝	花蕾
春黄	金黄色或黄绿色	薄；纸质	5月初-6月下旬为金黄色，6月末-10月末黄绿色	长2~8cm，宽1.5~6.5cm	金黄色或浅绿	金黄色或乳黄色
白丁香	深绿色	厚；近革质	5月初-10月末绿色	长2.5~10cm，宽2~8cm	绿色	白色或乳白色

申请品种春黄尚未公开销售。

斑斓

所属的种或属：山茱萸属

培育人：李长海 郁永英 翟晓欧 宋莹莹 范淼

申请人：黑龙江省森林植物园

申请号：20150126

申请日：2015年7月7日

说明：申请品种斑斓是培育人从偃伏柞木（*Cornus stolonifera* Michx.）播种苗中选育而出。申请品种斑斓的形态特征：落叶灌木，高可达2~3m，树皮暗紫红色，直立；幼枝浅绿有浅红晕，有白伏毛，2年生枝紫红色或暗紫红色，有散生皮孔；单叶对生，叶片披针形至长圆状卵形，长3-10cm，宽2-4cm，先端渐尖，基部楔形；叶片绿色，镶有不规则白色或浅黄色条状斑纹，下面黄白色、被糙伏毛，侧脉5对，脉腋簇生小乳头状长柔毛；叶芽黄红色，新生幼叶有黄绿色有黄斑纹；叶柄有红晕；聚伞形花序，直径2-5cm，有小花20-30，花白色，花瓣4，长3mm。核果白色，球形，直径约7mm。种子暗灰色，表面光滑，呈扁球形。花期5-9月；果期7-10月。

申请品种斑斓与近似种偃伏柞木的不同点：

品种	叶色	叶片质地	叶变色期	叶片大小	幼枝	幼叶
----	----	------	------	------	----	----

斑斓	绿色镶有白色或浅黄色斑纹	厚；	5 月初-10 月末均为绿白相间、斑斓色彩	长 3-10cm 宽 2-4cm	浅 绿 色 有 红 晕	叶芽黄红色 幼叶黄绿色 嵌黄斑纹
偃伏株木	深绿色	厚；近革质	5 月初-10 月末均为深绿色	长 5-12cm 宽 1.5-5cm	绿 色 有 红 晕	嫩绿色

申请品种斑斓尚未公开销售。

辉煌

所属的种或属： 山茱萸属

培育人： 李长海 郁永英 翟晓欧 宋莹莹 范淼

申请人： 黑龙江省森林植物园

申请号： 20150127

申请日： 2015 年 7 月 7 日

说 明：申请品种辉煌是培育人从偃伏株木（*Cornus stolonifera*）扦插苗中选育而来。申请品种辉煌株木的形态特征：落叶灌木，高可达 3~4 m，树皮暗紫红色，直立；幼枝浅绿或浅黄色，有白伏毛，2 年生枝紫红色或暗紫红色，有散生皮孔；单叶对生，叶片披针形至长圆状卵形，长 4-10cm，宽 1.5-4cm，先端渐尖，基部圆形；叶全缘，上面金黄色，近无毛，下面灰白黄色，被伏毛，侧脉 5 对，脉腋簇生小乳头状长柔毛。聚伞形花序，直径 3-6cm，有小花 30-50 多；花白色，花瓣 4，长 3mm。核果白色，球形，直径约 8mm。种子暗灰色，表面光滑，呈扁球形。花期 5-9 月；果期 7-10 月。

申请品种辉煌与近似种偃伏株木的不同点：

品种	叶色	叶片质地	叶变色期	叶片大小	幼枝	花蕾
辉煌	金黄色或黄绿色	薄；纸质	5 月初-6 月末为金黄色，7 月初-10 月末黄绿色	长 4-10cm 宽 1.5-4cm	金 黄 色 或 浅 绿	乳黄色
偃伏株木	深绿色	厚；近革质	5 月初-10 月末均为深绿色	长 5-12cm 宽 1.5-5cm	绿 色 有 红 晕	白色

申请品种辉煌尚未公开销售。

京仁 3 号

所属的种或属： 杏

培育人： 王玉柱 孙浩元 杨丽 张俊环 姜凤超

申请人： 北京市农林科学院林业果树研究所

申请号： 20150128

申请日： 2015 年 7 月 8 日

说 明：申请品种京仁 3 号是以仁用杏品种龙王帽(*Prunus armeniaca* L.) 母本，以从意大利引进的扁桃品种意大利 1 号(*Amygdalus communis* L.)为父本杂交选育获得。申请品种京仁 3

号树势中庸，树姿开张；主干条状纵裂；多年生枝灰褐色，皮孔稠密不均；一年生枝阳面颜色红褐色，幼树结果初期发枝力较强；叶片卵圆形，先端短尾尖，尖端夹角为中等钝角，基部钝圆，边缘锯齿细密，尖锯齿；叶柄长 2.8~3.6cm，叶柄蜜腺 2-3 个；花单生，极稀 2~3 朵簇生，花萼筒状，深紫红色；花瓣白色；果实 7 月中旬成熟，果实卵圆形，果顶圆凸；成熟时果皮淡黄色，向阳面具红晕；果核卵圆形，壳面较平滑，核仁饱满，甜仁，平均单仁重 1.10g，离核。

申请品种京仁 3 号与近似品种龙王帽比较的不同点如下：

品种名称	叶片	果实	核仁
京仁 3 号	叶片卵圆形，短尾尖，尖端夹角为中等钝角，叶缘锯齿为尖锯齿	果实卵圆形	核仁饱满，仁皮颜色较白
龙王帽	叶片近圆形，长尾尖，尖端夹角为大钝角，叶缘锯齿为双尖锯齿	果实椭圆形	核仁饱满，仁皮颜色棕黄

申请品种京仁 3 号尚未公开销售。

妖姬

所属的种或属： 木瓜属
 培育人： 刘宗钊 刘明广 赵英豪 徐兴东 马燕 臧德奎 孙居文
 申请人： 河东区金盛海棠种植专业合作社 山东农业大学
 申请号： 20150129
 申请日： 2015 年 7 月 8 日

说 明：申请品种妖姬为 1999 年沂州海棠（毛叶木瓜）为母本与大富贵为父本杂交后代单株选育而成。申请品种妖姬为大灌木，高达 2.5 m。幼叶黄绿色，背面有毛，幼枝黄绿色；叶片披针形，叶缘有锐锯齿；花 2-4 朵簇生，着花繁密；花梗长约 4-5 mm；花碗型，红色，直径 5-5.5 cm，花瓣不平展，20-25 枚，外部花瓣较大，内部 5-8 枚花瓣较小而显著皱褶，雄蕊散生于花瓣之间。偶结实，果实小而扁圆形。

申请品种妖姬与近似品种沂州木瓜、大富贵比较的不同点：

品种	幼叶下面	花径	花瓣	花色（RHS CC）
妖姬	少量绒毛	5-5.5 cm	20-25 枚，显著皱褶	亮红色，55A-B
沂州木瓜	密生绒毛	2-3.5 cm	5 枚，平展	白色或花瓣边缘紫红色 58B-C
大富贵	无毛	6-7 cm	25-35，平展	红色，41B-C

申请品种妖姬尚未公开销售。

醉杨妃

所属的种或属： 木瓜属
 培育人： 臧德奎 马燕 孙居文 刘宗钊 刘明广 赵英豪 徐兴东
 申请人： 山东农业大学 河东区金盛海棠种植专业合作社

申请号：20150130

申请日：2015 年 7 月 8 日

说明：申请品种醉杨妃是从沂州海棠（毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis*）播种苗中选择优良单株，经无性繁殖栽培试验获得。申请品种醉杨妃为大灌木，高达 3 米。幼叶黄绿色，边缘红褐色。叶片长椭圆形至长椭圆状披针形，长 8-11 cm，宽 3-4 cm，深绿色（RHS CC-137A-B），叶缘有尖锐锯齿；托叶肾形，基部偏斜。花 3-5 朵簇生，花梗长 4-5 mm。花萼 5，萼筒长圆柱形。花径 4-5 cm；花瓣 18-25 枚，近圆形，瓣爪短，约 3-5 mm。花初开时绿白色（RHS CC-157B）或花瓣边缘略带红色，后渐变浅红（RHS CC-39A）至红色（RHS CC-52B），花丝初为黄色，后渐变为红色。花期 4 月。

申请品种醉杨妃与近似品种沂州木瓜比较比较的不同点：

品种	幼叶下面	花径	花：重瓣性	花色（RHS CC）
醉杨妃	疏被绒毛	4-5 cm	重瓣，花瓣 18-25 枚	初开时绿白色（157B），后渐变浅红（39A）至红色（52B）
沂州木瓜	密被绒毛	2-3.5 cm	单瓣，花瓣 5 枚	白色或花瓣边缘略带紫红色（58B-C）

申请品种醉杨妃尚未公开销售。

绿蜜

所属的种或属：榕属

培育人：孙蕾 贾明 曲永赞 王开芳 王小芳 赵登超 徐同吉 孙锐 宋翠环

申请人：山东省林业科学研究院

申请号：20150131

申请日：2015 年 7 月 9 日

说明：申请品种绿蜜是 2011 年开始，本课题组在山东省开展了无花果种质资源普查工作，有目的选择山东范围内优质、特异的无花果优良单株。至 2012 年 4 月，从青皮品种中选出短枝型芽变品种。申请品种绿蜜树势旺盛，主干明显，有较明显的凸起，分枝少，枝条粗壮，树干灰白色，有细小浅纵裂纹；一年生枝为深暗绿色，两年生枝为褐色；叶片大，两面较粗糙，叶背有绒毛，叶色深绿，全缘或掌状 3-5 裂，裂刻长约叶长的 1/2，叶片平均长 28.9 厘米、叶片平均宽 19.1 厘米、叶片长宽比平均值 1.53，叶片平均面积 299.06 平方厘米，叶片平均周长 106.2 厘米，叶柄平均长 14.20 厘米；果实扁圆锥形，果实横径与青皮差不多，纵径较青皮小一些，果形指数 0.80，而青皮长圆或圆形；成熟时果皮黄绿色（青皮是绿色），果肉淡红色至琥珀色，无空心，果目封闭，不开张，秋果单果重 50 克，可溶性固形物含量 18%，果实成熟期为 8 月上旬至 10 月中下旬，风味佳。

申请品种绿蜜与近似品种青皮比较的不同点：

品种	树姿	节间距离 cm	叶形指数	果实形状	果形指数	果皮	果肉	果目	秋果平均单果重	可溶性固形物含量%
青皮	开张	2.87	1.58	圆形	0.87	绿色	紫红色	小，开张	60 克	16.7%
绿蜜	直立	2.35	1.53	圆锥形	0.80	黄绿色	淡红色	封闭，不开张	50 克	18%

申请品种绿蜜尚未公开销售。

金枝玉叶

所属的种或属： 无患子属

培育人： 邵文豪 姜景民 肖克青 董汝湘 刁松峰

申请人： 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 天台县满园春农林开发有限公司

申请号： 20150132

申请日： 2015 年 7 月 14 日

说明：申请品种金枝玉叶是 2008 年 4 月，在对浙江省天台县满园春农林开发有限公司基地中营建的无患子试验林进行资源调查时，发现 1 株芽变个体，其幼枝、芽以及叶片呈淡黄色或黄绿色，与无患子原种差异较大，2011 年起，从该芽变个体上剪取枝条嫁接扩繁获得。申请品种金枝玉叶为落叶乔木；幼枝和嫩芽淡黄色或黄绿色；叶片和叶轴早期淡黄色或黄绿色，后渐变为黄绿色或绿色，叶连柄长 25-45cm 或更长；小叶 5-8 对，通常近对生，叶片薄纸质，长椭圆状披针形或稍呈镰形，长 7-15cm 或更长，宽 2-5cm，顶端短尖或短渐尖，基部楔形，稍不对称，两面无毛或背面被微柔毛；小叶柄长约 0.5cm。花序顶生，圆锥形，花小辐射对称；果的发育分果片近球形，熟时橙黄色。花期 5-6 月，果期 9-11 月。

申请品种金枝玉叶与近似种无患子比较的不同点：

品种/性状	金枝玉叶	无患子
幼枝颜色	淡黄色或黄绿色	绿色
嫩芽颜色	淡黄色或黄绿色	绿色
叶片早期颜色	淡黄色或黄绿色	绿色
叶轴早期颜色	淡黄色或黄绿色	绿色

申请品种金枝玉叶尚未公开销售。

湘水粉彩

所属的种或属： 山茶属

培育人： 王湘南，陈永忠，彭邵锋，王瑞，陈隆升，罗健，杨小胡，马力

申请人： 湖南省林业科学院

申请号： 20150133

申请日： 2015 年 7 月 17 日

说明：申请品种湘水粉彩亲本系野生浙江红山茶（*Camellia chekiangoleosa*）枝条嫁接在普通油茶大树上培育而成，正常开花结果后采其自然授粉种子播种繁殖实生苗，从实生苗中选育出的一个花为重瓣大型的变异品种。申请品种湘水粉彩树高约 2.2m，冠呈塔形，分枝力强，长势旺盛。嫩枝无毛，老枝棕褐色，无毛；叶革质，椭圆或长椭圆形，叶长 8.0-10.5cm，宽 3.0-5.6cm，绿色光亮，两面无毛，基部略楔或近圆，边缘具细锯齿，侧脉 7-8 对，边缘具细锯齿，叶柄无毛，长 0.7-1.1mm。花大型，玫瑰重瓣型，花径 10.5-12cm，瓣阔倒卵形，先端内凹，苞萼片约 10-11 枚，颜色淡绿和褐色，外被银灰色绢毛，花瓣玫红至淡粉色，约 60 余枚，中心花瓣偶有白色拉丝条纹，外侧花瓣玫红色略深，宽圆，瓣长 4.0-4.5cm，宽 2.5-4.5cm，中心花瓣渐小，呈不规则形或长圆形，淡玫红至淡粉色；雄蕊 10-60 枚（不等），不同程度瓣化；花初开时颜色较深，开后略有变淡；花期中至晚，2 月下-4 月中下。花量大，花色艳丽，连续 4 年观察其特征和特异性明显。与亲本比较其枝、叶包括萼片等形态特征较相似，花型玫瑰重瓣型，花色玫红至淡粉色，无结果，花型色变异较大，特征明显，性状一致并保持了遗传稳定性。

申请品种湘水粉彩与近似种浙江红花油茶比较的不同点：

品种/种	叶	枝	花	果实
湘水粉彩	叶革质，深绿色，椭圆形或长椭圆形，叶长8-10.5cm，宽3-5.6cm，基部楔或近圆形，边缘具细锯齿，侧脉7-8对，叶柄光滑无毛。	嫩枝无毛，老枝灰棕色。	花玫红至淡粉色，玫瑰重瓣型，大型花，花瓣60余枚，阔倒卵形，先端内凹，中心花瓣偶有白色拉丝条纹，萼片淡绿和褐色，雄蕊10-60枚与瓣间生，有瓣化现象，花量大，花期中至晚。	不结果。
浙江红花油茶	叶厚革质，深绿色，椭圆或长椭圆形，长8-13cm，宽3-6cm，基部楔或阔楔形，边缘具疏锯齿，侧脉7-8对，叶柄光滑无毛。	嫩枝无毛，一年生枝灰白色。	花鲜艳的红色，单瓣型，中到大型花，花瓣6-8枚，倒心形，先端凹，萼片褐色，花心有大量金黄色雄蕊，雌雄蕊发育健全，花朵稠密可结果。花期中至晚。	蒴果近球形，果实大表面光滑。

申请品种湘水粉彩尚未公开销售。

素颜

所属的种或属：山茶属

培育人：王湘南，陈永忠，彭邵锋，王瑞，陈隆升，罗健，马力，杨小胡，彭映赫，王保明，许彦明

申请人：湖南省林业科学院

申请号：20150134

申请日：2015年7月17日

说明：申请品种素颜亲本系采云南腾冲地区野外自然生长的红花油茶（*Camellia reticulata* f. *Simplex*），又名滇山茶（*Camellia reticulata*）的枝条嫁接在普通油茶大树上培育而成，正常开花结果后采其自然授粉种子播种繁殖实生苗，从实生苗中选育出的白色花半重瓣型的变异品种。申请品种素颜树形较直立紧凑，枝叶长势较旺，幼枝略被微毛或无毛，绿色，老枝灰褐色；叶革质，长椭圆形，两端窄尖，长4.8-6.5 cm，宽2.2-2.7 cm，边缘具细锯齿，表面深绿色，背面淡绿色，叶柄边缘疏生柔毛；花白色半重瓣型，花瓣外侧带点淡淡的粉红，中到大型花，苞和萼片约8-10枚，革质或薄革质，绿色，外面被柔毛，里面被绢毛，花后未完全脱落；花瓣14-18枚，倒心形或不规则长圆形，长4-6 cm，宽2-4 cm，先端凹陷，基部略连生，与雄蕊管贴生；中心雄蕊多数，外轮雄蕊花丝中下部合生；子房球形，密被绒毛，3室，花柱先端多3裂，蒴果球或扁球形，棕黄色，果径3-5 cm。花期2月上-3月下。经4年观察其特征、特异性明显，与亲本比较枝、叶、果等形态特征较相似，而花型半重瓣型白色变异特征明显，性状具一致性并保持了遗传稳定。

申请品种素颜与近似种滇山茶比较的不同点：

品种/种	叶	枝	花	果实
素颜	叶革质，长椭圆形，长4.8-6.5cm，宽2.2-2.7cm，深绿色。	嫩枝略有微毛或无毛，绿色，老枝灰棕褐色。	花白色，外侧带点淡粉红，半重瓣型，中到大型花，瓣14-18枚，倒心形或长圆形，长4-6 cm，宽2-4 cm，先端凹陷，基部略连生，花心雄蕊多数，外轮花丝中下部合生。花期中至晚。	扁球形，淡黄色，果3-4 cm。
滇山茶	叶革质，椭圆或长椭圆形，长4-8cm，	嫩枝被柔毛后渐变无毛，	花红色，单瓣型，中到大型花，瓣5-7枚，倒心形，先端凹，花心雄蕊	球或扁球形，淡黄

	宽 2.5-4cm, 深绿色。	红棕色, 老枝灰褐色。	多数, 外轮花丝中下部合生, 可结果。花期中至晚。	色, 径 2-5 cm。
--	-----------------	-------------	---------------------------	--------------

申请品种素颜尚未公开销售。

沃林一号

所属的种或属: 越桔属

培育人: 孙蕾 廖甜甜 王开芳 郑建立 王小芳 岳清华 赵登超 高勇 刘翠兰 蔡宋宋 董克锋

申请人: 山东省林业科学研究院 沃林农业(青岛)有限公司

申请号: 20150135

申请日: 2015 年 7 月 28 日

说明: 申请品种沃林一号原代号 WL2011L119, 由早熟北高丛品种早蓝和高产品种蓝丰杂交选育而来。申请品种沃林一号树形呈直立状, 树势较强, 结果枝长 5cm~30cm, 粗 0.3cm~0.5cm, 枝条新稍嫩绿色, 一年生枝条黄绿色, 结果枝黄绿色; 每结果枝 10~16 片叶, 平均叶长 6.2cm, 平均叶宽 3.3cm, 叶面及叶缘平滑, 叶脉不明显, 叶尖微尖, 叶脉 6~10 对; 花白色, 灯笼状, 花冠长 0.6~0.7cm, 直径 0.5~0.6cm; 单个结果枝从顶端起有 5~7 个花芽, 圆、饱满, 其余为叶芽, 小、尖瘦, 单个花芽呈总状花序, 有 8~12 朵花, 平均坐果率 84.7%。果实扁圆形, 平均纵径 12.54mm, 平均横径 17.54mm, 果型指数 0.72, 果实成熟早, 成熟期集中, 果粒大, 果粉好, 果皮呈浅蓝色, 随着蓝色的加深变得更甜, 果蒂痕小而干, 平均单果重 1.9g, Brix12.8%, 可滴定酸含量 0.75%, 果实平均硬度 214g/mm, 虽带有酸味, 口味极佳。

申请品种沃林一号与近似品种早蓝、蓝丰的不同点:

品种	叶片形状	采摘期	首次采摘占比	平均单果重(g)	平均果实硬度(g/mm)	可溶性固形物 Brix%	可滴定酸(%)
沃林一号	长椭圆形	6/14 ~7/4	20%	1.9	214	12.8	0.75
早蓝	卵圆形	6/11 ~7/2	23%	1.7	220	11.6	0.33
蓝丰	长椭圆形	6/18 ~7/22	10%	2.0	190	11.7	0.96

申请品种沃林一号尚未公开销售。

沃林二号

所属的种或属: 越桔属

培育人: 王开芳 廖甜甜 孙蕾 郑建立 赵登超 高勇 刘翠兰 岳清华 王小芳 蔡宋宋 董克锋

申请人: 山东省林业科学研究院 沃林农业(青岛)有限公司

申请号: 20150136

申请日: 2015 年 7 月 28 日

说明: 申请品种沃林二号原代号 WL2011D1008, 由中晚熟北高丛品种布里吉塔和晚熟品种埃利奥特杂交选育而来。申请品种沃林二号树形呈直立状, 树势较强, 结果枝长 5 cm~30

cm，粗 0.3 cm~0.5 cm，枝条新稍嫩绿色，成熟枝条绿色略有红色，休眠期枝条呈朱红色。新叶成嫩绿色，成熟叶片深绿色，单个枝条上叶片 10~20 叶，平均叶长 5.5 cm，平均叶宽 3.2cm，叶面平展，长椭圆形，叶缘全缘，叶脉明显，叶尖微尖，叶脉 6~8 对；花白色略带粉色，灯笼状；单个结果枝有 6~8 个花芽，椭圆、饱满，单个花序呈总状花序，8~12 朵花，平均坐果率 86 %。果实扁圆形，平均纵径 11.73 mm，平均横径 16.45 mm，果型指数 0.71，果实成熟晚，果粒大，果粉好，果皮呈浅蓝色，果蒂痕小而干，平均单果重 1.9g，Brix 12.6 %，可滴定酸含量 1.22 %，果实平均硬度 214 g/mm，虽带有酸味，口味极佳。

申请品种沃林二号与近似品种布里吉塔、埃利奥特比较的不同点：

品种	叶片形状	叶缘	采摘期 (月/日)	平均单 果重 (g)	平均果实硬 度 (g/mm)	可溶性固 形物 Brix %	可滴定 酸 (%)
沃林二号	长椭圆形	全缘	7/14 ~8/22	1.9	214	12.6	1.22
布里吉塔	卵圆形	锯齿	6/28 ~7/25	2.0	220	13.3	1.1
埃利奥特	长椭圆形	全缘	7/10~8/16	1.7	175	12.0	1.55

申请品种沃林二号尚未公开销售。